

No.	がん種	プロトコル名
1	前立腺がん	«DP» DOC + PSL (75/10) (プレドニン)
2	前立腺がん	ジェブタナ (25) (プレドニン)
3	前立腺がん	CDDP + PSL (75/10) (プレドニン)
4	前立腺がん	Monthly DOC (60) (エストラサイト)
5	尿路上皮がん	«GC» GEM + CDDP (1000/70)
6	尿路上皮がん	«GC(3-week)» GEM + CDDP (1000/70)
7	尿路上皮がん	GEM + CBDCA (1000/5)
8	尿路上皮がん	GEM + PTX (1000/180)
9	尿路上皮がん	キイトルーダ (200)
10	尿路上皮がん	バベンチオ (10)
11	尿路上皮がん	パドセブ(1.25)
12	尿路上皮がん	キイトルーダ+パドセブ(200/1.25)
13	腎がん	オプジーボ (240)
14	腎がん	オプジーボ + ヤーボイ (240/1)
15	腎がん	オプジーボ + カボメティクス (240/40)
16	腎がん	キイトルーダ + インライタ (200/10)
17	腎がん	バベンチオ + インライタ (10/10)
18	腎がん	トーリセル (25)
19	腎がん	キイトルーダ + レンビマ(200/20)
20	精巣がん	CBDCA (7)
21	その他泌尿器がん	FOLFIRI (インフューザー) + BV(5) (尿膜管癌)

『DP』 DOC + PSL (75/10) (プレドニン)

## ジェブタナ (25) (プレドニン)

※4週間ごとに投与するレジメンもあります。

«GC» GEM + CDDP (1000/70)

«GC(3-week)» GEM + CDDP (1000/70)

GEM + CBDCA (1000/5)

GEM + PTX (1000/180)

**キイトルーダ (200)**

※キイトルーダを1回400mg、6週間ごとに投与するレジメンもあります。

バベンチオ (10)

オプジー<sup>ボ</sup> (240)

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

## オプジーボ + ヤーボイ (240/1)

## オプジーボ + カボメティクス (240/40)

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

キイトルーダ + インライタ (200/10)

※キイトルーダを1回400mg、6週間ごとに投与するレジメンもあります。

バベンチオ + インライタ (10/10)

## トーリセル (25)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻 (目安)	点滴時間	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
1	テルモ生食	500	mL	点滴(任意速度)		10:00		○						
2	大塚生食注 ネオレースタール注射液	100	mL	点滴		10:00	30分	○						
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30分	○						
4	大塚生食注 トーリセル点滴静注液	250	mL	点滴		11:00	30分	○						
5	大塚生食注	100	mL	点滴		11:30	60分	○						

[v2] ★Monthly DOC (60) (エストラサイト)

CBDCA (7)

[v2] FOLFIRI (インフューザー) + BV(5) (尿膜管癌)

パドセブ(1.25)

## ★キイトルーダ + レンビマ(200/20)

※6週間ごとのレジメンもあります。

★CDDP + PSL (75/10) (プレドニン)

キイトルーダ+パドセブ(200/1. 25)