

No.	がん種	プロトコル名
1	卵巣がん、子宮体がん、子宮頸がん	《TC》 PTX + CBDCA (175/5)
2	卵巣がん、子宮頸がん	PTX + CBDCA + BV (175/5/15)
3	卵巣がん	BV maintenance (15)
4	子宮体がん	《AP》 ADM + CDDP (60/50) (子宮体がん)
27	子宮体がん	キイトルーダ + レンビマ(200/20)
28	子宮頸がん	PTX + CBDCA + BV +キイトルーダ (175/5/15/200)
29	子宮頸がん	BV +キイトルーダ (15/200)
30	子宮頸がん	リブタヨ
5	子宮頸がん	Weekly CDDP (40)
6	卵巣がん	GEM + CBDCA (1000/4)
7	卵巣がん	GEM + CBDCA + BV (1000/4/15)
8	卵巣がん、子宮体がん、子宮頸がん	PTX + CDGP (180/75)
9	卵巣がん、子宮体がん、子宮頸がん	《DC》 DOC + CBDCA (70/5
10	卵巣がん	DOC + CBDCA + BV (70/5/15)
11	卵巣がん	PLD + CBDCA (30/5)
12	卵巣がん	PLD + CBDCA + BV (30/5/10)
13	卵巣がん、子宮体がん、子宮頸がん	Weekly PTX (80)
14	卵巣がん	Weekly PTX + BV (80/10)
15	卵巣がん、子宮頸がん	ハイカムチン (1.25)
16	卵巣がん	ハイカムチン + BV (1.25/15)
17	卵巣がん、子宮体がん	ドキシル (40)
18	卵巣がん	ドキシル + BV (40/10)
19	卵巣がん	BV + リムパーザ (15/600) (リムパーザ)
20	卵巣がん、子宮体がん	GEM (1000)
21	卵巣がん、子宮体がん、子宮頸がん	DOC (70)
22	卵巣がん、子宮体がん、子宮頸がん	CBDCA (6)
23	卵巣がん、子宮体がん、子宮頸がん	CDGP (100)
24	卵巣がん、子宮体がん、子宮頸がん	Weekly CPT-11 (100)
25	卵巣がん、子宮体がん、子宮頸がん	《IP》 CDDP + CPT-11 (60/60)
26	卵巣がん、子宮体がん、子宮頸がん	Monthly PTX (135)
27	子宮体がん	PTX + CBDCA + イミフィンジ (175/5/1120)
28	子宮体がん	イミフィンジ (1500)
29	子宮体がん	イミフィンジ+リムパーザ (1500/600)

[illegible]

[illegible]

BV maintenance (15)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ハイカムチン (1.25)

[illegible]

ハイカムチン + BV (1.25/15)

[illegible]

[illegible]

ドキシル + BV (40/10)

[illegible]

BV + リムパーザ (15/600) (リムパーザ)

[illegible]

[illegible]

DOC (70)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Weekly CPT-11 (100)

[illegible]

[illegible]

[v6] ★Monthly PTX (135)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	施用者コメント	開始時刻 (目安)	点滴時間	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28		
1	テルモ生食 500mL	500	mL	点滴 (任意速度)		10:00		○																													
	ソルデム3 A 500mL	500	mL																																		
2	大塚生食注 100mL	100	mL	点滴		10:00	30分	○																													
	デキサート注射液6.6mg(エステルとして8mg)	16	mg																																		
	デキサート注射液1.65mg(エステルとして2mg)	4	mg																																		
	ファモチジン注射液 20mg「トロー」	20	mg																																		
3	グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 3mg/100mL「F」	100	mL	点滴		10:30	30分	○																													
4	テルモ生食 500mL	500	mL	点滴		11:00	3時間	○																													
	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	135	mg/m ²																																		

★キイトルーダ + レンビマ (200/20)

※キイトルーダが6週ごと（400mg）のレジメンもあります。

[illegible]

[v2]★PTX + CBDCA + BV +キイトルーダ (175/5/15/200)

[illegible]

[v2]BV +キイトルーダ (15/200)

[illegible]

リブタヨ (350)

[illegible]

★PTX + CBDCA + イミフィンジ (175/5/1120)

[illegible]

イミフィンジ (1500)

[illegible]

[v2] イミフィンジ+リムパーザ (1500/600)

[illegible]