








No.	対象	レジメン名	1サイクル (日)
1	尿路上皮がん	≪GC≫ GEM + CDDP (1000/70)	28
2	尿路上皮がん	≪GC(3-week)≫ GEM + CDDP (1000/70)	21
3	尿路上皮がん	GEM + CBDCA (1000/5)	21
4	尿路上皮がん	キイトルーダ (200)	21
5	前立腺がん	Tri-weekly DOC (60) (エストラサイト)	21
6	前立腺がん	Monthly DOC (60) (エストラサイト)	28
7	腎がん	オプジーボ (240)	14
8	腎がん	オプジーボ + ヤーボイ (240/1)	21
9	腎がん	キイトルーダ + インライタ (200/10)	21

No.1

<<GC>> GEM + CDDP (1000/70)








				1コース (28日間)					
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	・・・	●	・・・	●	・・・	
2	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 12mg プロイメンド 150mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	・・・					
3	グラニセトロン 3mg デキサート 4mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	・・・		●	・・・	●	・・・	
4	生理食塩液 ゲムシタピン 1000mg/m ²  化学療法薬	約30分 10:30~11:00	●	・・・	●	・・・	●	・・・	
5	生理食塩液 硫酸マグネシウム 8mEq  輸液 腎障害予防	約30分 11:00~11:30	●	・・・					
6	生理食塩液 シスプラチン 70mg/m ²  化学療法薬	約1.5時間 11:30~13:00	●	・・・					
7	生理食塩液 フロセミド 20mg  輸液 利尿薬	約1.5時間 13:00~14:30	●	・・・					

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。

No.2

≪GC(3-week)≫ GEM + CDDP (1000/70)






順序	治療内容	投与時間	1コース (21日間)			
			1日目	・・・	8日目	・・・
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	・・・	●	・・・
2	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 12mg プロイメンド 150mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	・・・	●	・・・
3	グラニセトロン 3mg デキサート 4mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	・・・	・・・	●	・・・
4	生理食塩液 ゲムシタピン 1000mg/m ²  化学療法薬	約30分 10:30~11:00	●	・・・	●	・・・
5	生理食塩液 硫酸マグネシウム 8mEq  輸液 腎障害予防	約30分 11:00~11:30	●	・・・	●	・・・
6	生理食塩液 シスプラチン 70mg/m ²  化学療法薬	約1.5時間 11:30~13:00	●	・・・	●	・・・
7	生理食塩液 フロセミド 20mg  輸液 利尿薬	約1.5時間 13:00~14:30	●	・・・	●	・・・

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.3

GEM + CBDCA (1000/5)



順序	治療内容	投与時間	1コース (21日間)			
			1日目	・・・	8日目	・・・
1	ソルデム 3 A  輸液	任意速度	●	・・・	●	・・・
2	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 10:00～10:30	●	・・・		
3	グラニセトロン 3mg デキサート 4mg  吐き気止め	約30分 10:00～10:30	・・・	●	・・・	
4	生理食塩液 ゲムシタビン 1000mg/m ²  化学療法薬	約30分 10:30～11:00	●	・・・	●	・・・
5	生理食塩液 カルボプラチン AUC=5  化学療法薬	約1時間 11:00～12:00	●	・・・		

*投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.4

キイトルーダ (200)






			1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 キイトルーダ 200mg  化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.5

Tri-weekly DOC (60) (エストラサイト)





			1コース(21日間)	
順序	治療薬	投与時間	1日目
内服	エストラサイト 560mg (服用しない場合もあります)  化学療法薬	内服	 連日内服	
1	ソルデム3A または生理食塩液  無色 輸液	任意速度	●
2	グラニセトロン 3mg デキサート 4mg  無色 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●
3	5%糖液 ドセタキセル 60mg/m ²  無色 化学療法薬	約1時間 10:30~11:30	●

*投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.6

Monthly DOC (60) (エストラサイト)



			1コース(28日間)	
順序	治療薬	投与時間	1日目
内服	エストラサイト 560mg (服用しない場合もあります)	 化学療法薬	内服	 連日内服
1	ソルデム3A または生理食塩液	 無色 輸液	任意速度	●
2	グラニセトロン 3mg デキサート 4mg	 無色 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●
3	5%糖液 ドセタキセル 60mg/m ²	 無色 化学療法薬	約1時間 10:30~11:30	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。

No.7

オプジーボ (240)

			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  無色 輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 オプジーボ 240mg  無色 化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.8

オプジーボ + ヤーボイ (240/1)

			1コース(21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 オプジーボ 240mg  化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●
3	生理食塩液  輸液	約30分 10:30~11:00	●
4	生理食塩液 ヤーボイ 1mg/kg  化学療法薬	約30分 11:00~11:30	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.9

キイトルーダ + インライタ (200/10)

		1コース (21日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目
内服	インライタ 10mg (経過みて用量調節) <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;">○</div> 化学療法薬	内服	連日内服	
1	生理食塩液 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> 無色 </div> 輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 キイトルーダ 200mg <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> 無色 </div> 化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。