

No.	がん種	プロトコル名
1	前立腺がん	≪DP≫ DOC + PSL (75/10) (プレドニン)
2	前立腺がん	ジェブタナ (25) (プレドニン)
3	尿路上皮がん	≪GC≫ GEM + CDDP (1000/70)
4	尿路上皮がん	≪GC(3-week)≫ GEM + CDDP (1000/70)
5	尿路上皮がん	GEM + CBDCA (1000/5)
6	尿路上皮がん	GEM + PTX (1000/180)
7	尿路上皮がん	キイトルーダ (200)
8	尿路上皮がん	バベンチオ (10)
9	腎がん	オプジーボ (240)
10	腎がん	オプジーボ + ヤーボイ (240/1)
11	腎がん	オプジーボ + カボメティクス (240/40)
12	腎がん	キイトルーダ + インライタ (200/10)
13	腎がん	バベンチオ + インライタ (10/10)
14	腎がん	トーリセル (25)

《DP》 DOC + PSL (75/10) (プレドニン)

[illegible]

ジェブタナ (25) (プレドニン)

※4週間ごとに投与するレジメンもあります。

[illegible]

«GC» GEM + CDDP (1000/70)

[illegible]

«GC (3-week)» GEM + CDDP (1000/70)

[illegible]

GEM + CBDCA (1000/5)

[illegible]

GEM + PTX (1000/180)

[illegible]

キイトルーダ (200)

※キイトルーダを1回400mg、6週間ごとに投与するレジメンもあります。

[illegible]

バベンチオ (10)

[illegible]

オブジーボ (240)

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

[illegible]

オプジーボ + ヤーボイ (240/1)

[illegible]

オプジーボ + カボメティクス (240/40)

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

[illegible]

キイトルーダ + インライタ (200/10)

※キイトルーダを1回400mg、6週間ごとに投与するレジメンもあります。

[illegible]

バベンチオ + インライタ (10/10)

[illegible]

トーリセル (25)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻 (目安)	点滴時間	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
1	テルモ生食	500	mL	点滴 (任意速度)		10:00		○						
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30 分	○						
	ネオレスタール注射液	10	mg											
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30 分	○						
4	大塚生食注	250	mL	点滴		11:00	30 分	○						
	トーリセル点滴静注液	25	mg											
5	大塚生食注	100	mL	点滴		11:30	60 分	○						