

No.	プロトコル名
1	mFOLFOX6 (インフューザー)
2	XELOX (130/2000) (ゼローダ)
3	FOLFIRI (インフューザー)
4	mFOLFOX6 (インフューザー) + BV (5)
5	XELOX (130/2000) (ゼローダ) + BV (7.5)
6	FOLFIRI (インフューザー) + BV (5)
7	XELIRI (1600/200) (ゼローダ) + BV (7.5)
8	ゼローダ + BV (2000/7.5) (ゼローダ)
9	mFOLFOX6 (インフューザー) + Cet (400→250)
10	FOLFIRI (インフューザー) + Cet (400→250)
11	CPT-11 + Cet (100/400→250)
12	Cet単独 (400→250)
13	mFOLFOX6 (インフューザー) + Pan (6)
14	FOLFIRI (インフューザー) + Pan (6)
15	Pan単独 (6)
16	FOLFIRI (インフューザー) + サイラムザ (8)
17	FOLFIRI (インフューザー) + ザルトラップ (4)
18	mFOLFOXIRI (インフューザー) + BV (5)
19	bw Cet + ビラフトビ + メクトビ (500/300/90)
20	bw Cet + ビラフトビ (500/300)
21	オブジーボ (240) (MSI-High)
22	オブジーボ + ヤーボイ (240/1) (MSI-High)

[illegible]

XELOX (130/2000) (ゼロータ)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

XELOX (130/2000) (ゼロダ) + BV (7.5)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ゼロータ + BV (2000/7.5) (ゼロータ)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CPT-11 + Cet (100/400→250)

※アービタックスを1回500mg/m²、2週間ごとに投与するレジメンもあります。

[illegible]

Cet単独 (400→250)※アービタックスを1回500mg/m²、2週間ごとに投与するレジメンもあります。

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻 (目安)	点滴時間	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
1	テルモ生食	500	mL	点滴 (任意速度)		10:00		○						
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30分	○						
	デキサート注射液	8	mg											
	ネオレスタール注射液	10	mg											
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30分	○						
4	大塚生食注	250	mL	点滴		11:00	2時間	○						
	アービタックス注射液	400	mg/m ²											
	※2回目以降250mg/m ² (1時間)													
5	大塚生食注	100	mL	点滴		13:00	1時間	○						

[illegible]

[illegible]

Pan单独 (6)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

mFOLFIRI (インフューザー) + BV (5)

※イリノテカンを165mg/m²、5-FUを3200mg/m²としたレジメンもあります。

[illegible]

bw Get + ビラフトビ + メクトビ (500/300/90)

[illegible]

bw Cet + ビラフトビ (500/300)

[illegible]

オプジーボ (240) (MSI-High)

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

[illegible]

オプジーボ + ヤーボイ (240/1) (MSI-High)

[illegible]