







No.	対象	レジメン名	1サイクル (日)
1	非小細胞肺癌	≪PV≫ CDDP + VNR (80/25)	21
2	非小細胞肺癌	CDDP + アリムタ (75/500)	21
3	非小細胞肺癌	CBDCA + アリムタ (6/500)	21
4	非小細胞肺癌	CBDCA + アブラキサン (6/100)	21
5	非小細胞肺癌	DOC (60)	21
6	非小細胞肺癌	サイラムザ + DOC (10/60)	21
7	非小細胞肺癌	オプジーボ (240)	14
8	非小細胞肺癌	キイトルーダ (200)	21
9	非小細胞肺癌	テセントリク (1200)	21
10	非小細胞肺癌	イミフィンジ (10)	14
11	非小細胞肺癌	Tri-weekly CBDCA + PTX + BV + テセントリク (6/175/15/1200)	21
12	非小細胞肺癌	BV + テセントリク (15/1200) (維持療法)	21
13	非小細胞肺癌	CDDP + アリムタ + キイトルーダ (75/500/200)	21
14	非小細胞肺癌	CBDCA + アリムタ + キイトルーダ (5/500/200)	21
15	非小細胞肺癌	アリムタ + キイトルーダ (500/200) (維持療法)	21
16	非小細胞肺癌	CBDCA + アブラキサン + キイトルーダ (6/100/200)	21
17	小細胞肺癌	≪PE≫ CDDP + VP-16 (80/100)	21
18	小細胞肺癌	≪CbE≫ CBDCA + VP-16 (5/100)	21
19	小細胞肺癌	≪IP≫ CDDP + CPT-11 (60/60)	28
20	小細胞肺癌	AMR (45) (div)	21
21	小細胞肺癌	ハイカムチン (1)	21
22	小細胞肺癌	CBDCA + VP-16 + テセントリク (5/100/1200)	21
23	小細胞肺癌	テセントリク (1200) (維持療法)	21

No.1

《PV》 CDDP + VNR (80/25)

				1コース (21日間)				
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	・・・	●		・・・	
2	生理食塩液 プロイメンド 150mg アロキシ 0.75mg デキサート 12mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●				・・・	
3	生理食塩液 デキサート 4mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30		・・・	●		・・・	
4	生理食塩液 ナベルピン 25mg/m ²  化学療法薬	約5分 10:30~10:35	●	・・・	●		・・・	
5	ソルデム 3 A  輸液	約20分 10:35~10:55	●	・・・	●		・・・	
6	生理食塩液 硫酸マグネシウム 8mEq  輸液 腎障害予防	約1.5時間 10:55~12:25	●				・・・	
7	生理食塩液 シスプラチン 80mg/m ²  化学療法薬	約1.5時間 12:25~13:55	●				・・・	
8	生理食塩液 フロセミド 20mg  輸液 利尿薬	約1.5時間 13:55~15:25	●				・・・	

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.2

CDDP + アリムタ (75/500)

					1コース (21日間)	
順序	治療内容		投与時間	1日目	
1	ソルデム3 A または生理食塩液	 無色 輸液	任意速度	●	
2	生理食塩液	 無色 輸液	約1.5時間 10:00~11:30	●	
3	生理食塩液 プロイメンド 150mg アロキシ 0.75mg デキサート 12mg	 無色 吐き気止め	約30分 11:30~12:00	●	
4	生理食塩液 アリムタ 500mg/m ²	 無色 化学療法薬	約10分 12:00~12:10	●	
5	ソルデム3 A 硫酸マグネシウム 8mEq	 無色 腎障害予防	約30分 12:10~12:40	●	
6	生理食塩液 シスプラチン 75mg/m ²	 無色 化学療法薬	約1.5時間 12:40~14:10	●	
7	生理食塩液 フロセミド 20mg	 無色 利尿薬	約1.5時間 14:10~15:40	●	

※パンビタン末 1gを連日内服します。シアノコバラミン 1mgを9週間ごとに筋注します。

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.3

CBDCA + アリムタ (6/500)

			1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●
3	生理食塩液 アリムタ 500mg/m ²  化学療法薬	約10分 10:30~10:40	●
4	ソルデム 3 A  輸液	約30分 10:40~11:10	●
5	生理食塩液 カルボプラチン AUC=6  化学療法薬	約1時間 11:10~12:10	●






※パンビタン末 1gを連日内服します。シアノコバラミン 1mgを9週間ごとに筋注します。

*投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.4

CBDCA + アブラキサン (6/100)




1コース (21日間)									
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	・・・
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	・・・	●	・・・	●	・・・	・・・
2	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●					
3	グラニセトロン 3mg デキサート 4mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30		●	・・・	●	・・・	・・・
4	生理食塩液 アブラキサン 100mg/m ²  化学療法薬	約30分 10:30~11:00	●	・・・	●	・・・	●	・・・	・・・
5	生理食塩液 カルボプラチン AUC=6  化学療法薬	約1時間 11:00~12:00	●					

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.5

DOC (60)

			1コース (21日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目	
1	ソルデム 3 A または生理食塩液 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;">  </div> 輸液	任意速度	●	
2	グラニセトロン 3mg デキサート 4mg <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;">  </div> 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	
3	5%糖液 ドセタキセル 60mg/m ² <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;">  </div> 化学療法薬	約1時間 10:30~11:30	●	

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.6

サイラムザ + DOC (10/60)

			1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	グラニセトロン 3mg デキサート 4mg ネオレスタール 10mg  アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●
3	生理食塩液 サイラムザ 10mg/kg  化学療法薬	約1時間 10:30~11:30	●
4	生理食塩液  輸液	約1時間 11:30~12:30	●
5	生理食塩液 ドセタキセル 60mg/m ²  化学療法薬	約1時間 12:30~13:30	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.7

オプジーボ (240)



			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 オプジーボ 240mg  化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.8

キイトルーダ (200)



			1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 キイトルーダ 200mg  化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.9

テセントリク (1200)



			1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 テセントリク 1200mg  化学療法薬	約1時間 10:00~11:00	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.10

イミフィンジ (10)




			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 イミフィンジ 10mg/kg  化学療法薬	約1時間 10:00~11:00	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.11

Tri-weekly CBDCA + PTX +BV + テセントリク (6/175/15/1200)

			1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液  化学療法薬 テセントリク 1200mg	約1時間 10:00~11:00	●
3	生理食塩液  輸液	約5分 11:00~11:05	●
4	生理食塩液  化学療法薬 アバスチン 15mg/kg	約1.5時間 11:05~12:35	●
5	生理食塩液  アレルギー予防 デキサート 20mg 吐き気止め ファモチジン 20mg	約30分 12:35~13:05	●
6	生理食塩液  吐き気止め アロキシ 0.75mg	約30分 13:05~13:35	●
7	生理食塩液  化学療法薬 パクリタキセル 175mg/m ²	約3時間 13:35~16:35	●
8	生理食塩液  化学療法薬 カルボプラチン AUC=6	約1時間 16:35~17:35	●





※パクリタキセルのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.12

BV + テセントリク (15/1200) (維持療法)

			1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 テセントリク 1200mg  化学療法薬	約1時間 10:00~11:00	●
3	生理食塩液  輸液	約5分 11:00~11:05	●
4	生理食塩液 アバスチン 15mg/kg  化学療法薬	約1.5時間 11:05~12:35	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.13

CDDP + アリムタ + キイトルーダ (75/500/200)

						1コース (21日間)	
順序	治療内容		投与時間	1日目		
1	生理食塩液	 無色 輸液	任意速度	●		
2	生理食塩液 キイトルーダ 200mg	 無色 化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●		
3	生理食塩液	 無色 輸液	約1.5時間 10:30~12:00	●		
4	生理食塩液 プロイメンド 150mg アロキシ 0.75mg デキサート 12mg	 無色 吐き気止め	約30分 12:00~12:30	●		
5	生理食塩液 アリムタ 500mg/m ²	 無色 化学療法薬	約10分 12:30~12:40	●		
6	ソルデム 3 A 硫酸マグネシウム 8mEq	 無色 輸液 腎障害予防	約30分 12:40~13:10	●		
7	生理食塩液 シスプラチン 75mg/m ²	 無色 化学療法薬	約1.5時間 13:10~14:40	●		
8	生理食塩液 フロセミド 20mg	 無色 輸液 利尿薬	約1.5時間 14:40~16:10	●		

※バンピタン末 1gを連日内服します。シアノコバラミン 1mgを9週間ごとに筋注します。

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.14

CBDCA + アリムタ + キイトルーダ (5/500/200)

			1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液  化学療法薬 キイトルーダ 200mg	約30分 10:00~10:30	●
3	生理食塩液  輸液	約5分 10:30~10:35	●
4	生理食塩液  吐き気止め アロキシ 0.75mg デキサート 8mg	約30分 10:35~11:05	●
5	生理食塩液  化学療法薬 アリムタ 500mg/m ²	約10分 11:05~11:15	●
6	ソルデム 3 A  輸液	約30分 11:15~11:45	●
7	生理食塩液  化学療法薬 カルボプラチン AUC=5	約1時間 11:45~12:45	●

※パンビタン末 1gを連日内服します。シアノコバラミン 1mgを9週間ごとに筋注します。

*投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.15

アリムタ + キイトルーダ (500/200) (維持療法)

			1コース (21日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目	
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	
2	生理食塩液 キイトルーダ 200mg  化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●	
3	生理食塩液  輸液	約5分 10:30~10:35	●	
4	グラニセトロン 3mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 10:35~11:05	●	
5	生理食塩液 アリムタ 500mg/m ²  化学療法薬	約10分 11:05~11:15	●	







※パンビタン末 1gを連日内服します。シアノコバラミン 1mgを9週間ごとに筋注します。

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.16

CBDCA + アブラキサン + キイトルーダ (6/100/200)

		1コース (21日間)						
順序	治療内容	投与時間	1日目	...	8日目	...	15日目	...
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	...	●	...	●	...
2	生理食塩液 キイトルーダ 200mg  化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●				
3	生理食塩液  輸液	約5分 10:30~10:35	●				
4	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 10:35~11:05	●				
5	グラニセトロン 3mg デキサート 4mg  吐き気止め	約30分 10:35~11:05		●	...	●	...
6	生理食塩液 アブラキサン 100mg/m ²  化学療法薬	約30分 11:05~11:35	●	...	●	...	●	...
7	生理食塩液 カルボプラチン AUC=6  化学療法薬	約1時間 11:35~12:35	●				

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.17

《PE》 CDDP + VP-16 (80/100)


				1コース (21日間)			
順序	治療内容		投与時間	1日目	2日目	3日目
1	ソルデム 3 A または生理食塩液	 無色 輸液	任意速度	●	●	●
2	生理食塩液 プロイメンド 150mg アロキシ 0.75mg デキサート 12mg	 無色 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●		
3	生理食塩液 デキサート 2mg	 無色 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	...	●	●
4	5%糖液 ラストット 100mg/m ²	 無色 化学療法薬	約2時間 10:30~12:30	●	●	●
5	生理食塩液 硫酸マグネシウム 8mEq	 無色 腎障害予防	約1.5時間 12:30~14:00	●		
6	生理食塩液 シスプラチン 80mg/m ²	 無色 化学療法薬	約1.5時間 14:00~15:30	●		
7	生理食塩液 フロセミド 20mg	 無色 利尿薬	約1.5時間 15:30~17:00	●		

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.18

《CbE》 CBDCA + VP-16 (5/100)








				1コース (21日間)			
順序	治療内容	投与時間	1日目	2日目	3日目	
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	●	●	
2	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●			
3	生理食塩液 デキサート 4mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	●	
4	5%糖液 ラストット 100mg/m ²  化学療法薬	約2時間 10:30~12:30	●	●	●	
5	生理食塩液 カルボプラチン AUC=5  化学療法薬	約1時間 12:30~13:30	●			

*投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.19

<<IP>> CDDP + CPT-11 (60/60)

		1コース (28日間)						
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	・・・	●	・・・	●	・・・
2	生理食塩液 プロイメンド 150mg アロキシ 0.75mg デキサート 12mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	・・・				
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	・・・		●	・・・	●	・・・
4	生理食塩液 イリノテカン 60mg/m ²  化学療法薬	約1.5時間 10:30~12:00	●	・・・	●	・・・	●	・・・
5	生理食塩液 硫酸マグネシウム 8mEq  輸液 腎障害予防	約1.5時間 12:00~13:30	●	・・・				
6	生理食塩液 シスプラチン 60mg/m ²  化学療法薬	約1.5時間 13:30~15:00	●	・・・				
7	生理食塩液 フロセミド 20mg  輸液 利尿薬	約1.5時間 15:00~16:30	●	・・・				



* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。

No.20

AMR (45) (div)

1コース (21日間)

順序	治療内容	投与時間	1コース (21日間)			
			1日目	2日目	3日目
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	●	●
2	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●		
3	生理食塩液 デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	...	●	●
4	生理食塩液 カルセド 45mg/m ²  化学療法薬	約5分 10:30~10:35	●	●	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.21

ハイカムチン (1)

		1コース (21日間)						
順序	治療内容	投与時間	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	●	●	●	●
2	生理食塩液 ハイカムチン 1mg/m ²  化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●	●	●	●	●

*投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.22

CBDCA + VP-16 + テセントリク (5/100/1200)



				1コース (21日間)			
順序	治療内容	投与時間	1日目	2日目	3日目	
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	●	●	
2	生理食塩液 テセントリク 1200mg  化学療法薬	約1時間 10:00~11:00	●			
3	生理食塩液  輸液	約5分 11:00~11:05	●			
4	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 11:05~11:35	●			
5	生理食塩液 デキサート 4mg  吐き気止め	約30分 11:05~11:35	...	●	●	
6	5%糖液 ラステット 100mg/m ²  化学療法薬	約2時間 11:35~13:35	●	●	●	
7	生理食塩液 カルボプラチン AUC=5  化学療法薬	約1時間 13:35~14:35	●			

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.23

テセントリク (1200) (維持療法)

			1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液  化学療法薬 テセントリク 1200mg	約1時間 10:00~11:00	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。