No.	がん種	プロトコル名
1	非小細胞肺がん	CDDP + PEM (75/500)
2	非小細胞肺がん	CBDCA + PEM (6/500)
3	非小細胞肺がん	PEM (500)
4	非小細胞肺がん	≪PG≫ CDDP + GEM (80/1000)
5	非小細胞肺がん	≪CbG≫ CBDCA + GEM (5/1000)
6	非小細胞肺がん	≪PV≫ CDDP + VNR (80/25)
7	非小細胞肺がん	≪IP≫ CDDP + CPT-11 (80/60)
8	非小細胞肺がん	CBDCA + S-1 (5/80) (TS-1)
9	非小細胞肺がん	≪CbP≫ Tri-weekly CBDCA + PTX (6/200)
10	非小細胞肺がん	CBDCA + アブラキサン (6/100)
11	非小細胞肺がん	CDGP + DOC (100/60)
12	非小細胞肺がん	DOC (60)
13	非小細胞肺がん	GEM (1000)
14	非小細胞肺がん	VNR (25)
15	非小細胞肺がん	Tri-weekly CBDCA + PTX + BV (6/200/15)
16	非小細胞肺がん	BV maintenance (15)
17	非小細胞肺がん	BV + タルセバ (15/150) (タルセバ)
18	非小細胞肺がん	サイラムザ + DOC (10/60)
19	非小細胞肺がん	サイラムザ + タルセバ (10/150) (タルセバ)
20	非小細胞肺がん	オプジーボ (240)
21	非小細胞肺がん	キイトルーダ (200)
22	非小細胞肺がん	テセントリク (1200)
23	非小細胞肺がん	イミフィンジ (10)
24	非小細胞肺がん	オプジーボ + ヤーボイ (360/1)
25	非小細胞肺がん	CDDP + PEM + オプジーボ + ヤーボイ (75/500/360/1)
26	非小細胞肺がん	CBDCA + PEM + オプジーボ + ヤーボイ (6/500/360/1)
27	非小細胞肺がん	Tri-weekly CBDCA + PTX + オプジーボ + ヤーボイ (6/200/360/1)
28	非小細胞肺がん	CDDP + PEM + キイトルーダ (75/500/200)
29	非小細胞肺がん	CBDCA + PEM + キイトルーダ (5/500/200)
30	非小細胞肺がん	PEM + キイトルーダ (500/200) (維持療法)
31	非小細胞肺がん	CBDCA + アブラキサン + キイトルーダ (6/100/200)0)
32	非小細胞肺がん	Tri-weekly CBDCA + PTX + BV + テセントリク (6/175/15/1200
33	非小細胞肺がん	BV + テセントリク (15/1200) (維持療法)
34	非小細胞肺がん	CBDCA + PEM + テセントリク (6/500/1200)
35	非小細胞肺がん	PEM + テセントリク (500/1200)
36	非小細胞肺がん	CBDCA + アブラキサン + テセントリク (6/100/1200)
37	小細胞肺がん	≪IP≫ CDDP + CPT-11 (60/60)
38	小細胞肺がん	≪ICb≫ CBDCA + CPT-11 (5/50)
39	小細胞肺がん	≪PE≫ CDDP + VP-16 (80/100)
40	小細胞肺がん	≪CbE≫ CBDCA + VP-16 (5/100)
41	小細胞肺がん	AMR (45) (div)
42	小細胞肺がん	ハイカムチン (1)
43	小細胞肺がん	Weekly PTX (80) (6投2休)
44	小細胞肺がん	CBDCA + VP-16 + テセントリク (5/100/1200)
45	小細胞肺がん	テセントリク (1200) (維持療法)
46	小細胞肺がん	CDDP + VP-16 + イミフィンジ (80/100/1500)
47	小細胞肺がん	CBDCA + VP-16 + イミフィンジ (5/100/1500)
48	小細胞肺がん	イミフィンジ (1500)
49	胸膜中皮腫	CDDP + PEM (75/500) (胸膜中皮腫)
50	胸膜中皮腫	CBDCA + PEM (5/500) (胸膜中皮腫)
51	胸膜中皮腫	オプジーボ (240) (胸膜中皮腫)
52	胸膜中皮腫	オプジーボ + ヤーボイ (360/1) (胸膜中皮腫)

1

CDDP + PEM (75/500)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	1000	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	テルモ生食	500	mL	点滴		10:00	1.5	時間	○																				
3	大塚生食注	100	mL	点滴		11:30	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	12	mg																										
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																										
4	大塚生食注	100	mL	点滴		12:00	10	分	○																				
	アリムタ注射用	500	mg/㎡																										
	※葉酸、ビタミンB12併用																												
5	ソルデム3A	200	mL	点滴		12:10	30	分	○																				
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL	8	mL																										
6	テルモ生食	300	mL	点滴		12:40	1.5	時間	○																				
	シスプラチン点滴静注	75	mg/㎡																										
7	テルモ生食	500	mL	点滴		14:10	1.5	時間	○																				
	フロセミド注射液	20	mg																										

2

CBDCA + PEM (6/500)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	10	分	○																				
	アリムタ注射用	500	mg/㎡																										
	※葉酸、ビタミンB12併用																												
4	ソルデム3A	200	mL	点滴		10:40	30	分	○																				
5	大塚生食注	250	mL	点滴		11:10	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC																										

3

PEM (500)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食 500mL	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	デキサート注射液	8	mg																										
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	10	分	○																				
	アリムタ注射用	500	mg/㎡																										
	※葉酸、ビタミンB12併用																												

4

≪PG≫ CDDP + GEM (80/1000)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	1000	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00										○													
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	12	mg																										
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																										
4	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分								○													
	デキサート注射液	4	mg																										
5	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30	分	○							○													
	ゲムシタビン点滴静注用	1000	mg/㎡																										
6	テルモ生食	500	mL	点滴		11:00	1.5	時間	○																				
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL	8	mL																										
7	テルモ生食	300	mL	点滴		12:30	1.5	時間	○																				
	シスプラチン注	80	mg/㎡																										
8	テルモ生食	500	mL	点滴		14:00	1.5	時間	○																				
	フロセミド注射液	20	mg																										

5

≪CbG≫ CBDCA + GEM (5/1000)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○													
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
3	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分								○													
	デキサート注射液	4	mg																										
4	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30	分	○							○													
	ゲムシタビン点滴静注用	1000	mg/㎡																										
5	大塚生食注	250	mL	点滴		11:00	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC																										

≪PV≫ CDDP + VNR (80/25)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	1000	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00										○													
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																										
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	12	mg																										
4	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分								○													
	デキサート注射液	4	mg																										
5	大塚生食注	50	mL	点滴		10:30	5	分	○							○													
	ロゼウス静注液	25	mg/㎡																										
6	ソルデム3A	200	mL	点滴		10:35	20	分	○							○													
7	テルモ生食	500	mL	点滴		10:55	1.5	時間	○																				
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL	8	mL																										
8	テルモ生食	300	mL	点滴		12:25	1.5	時間	○																				
	シスプラチン注	80	mg/㎡																										
9	テルモ生食 500mL	500	mL	点滴		13:55	1.5	時間	○																				
	フロセミド注射液	20	mg																										

≪IP≫ CDDP + CPT-11 (80/60)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28
1	ソルデム3A または テルモ生食	1000	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																											
2	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00										○							○													
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																											
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																																	
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																																	
	デキサート注射液	12	mg																																	
4	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分								○							○													
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																																	
	デキサート注射液	8	mg																																	
5	テルモ生食	500	mL	点滴		10:30	1.5	時間	○							○							○													
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	60	mg/㎡																																	
6	テルモ生食	500	mL	点滴		12:00	1.5	時間	○																											
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL	8	mL																																	
7	テルモ生食	300	mL	点滴		13:30	1.5	時間	○																											
	シスプラチン注	80	mg/㎡																																	
8	テルモ生食	500	mL	点滴		15:00	1.5	時間	○																											
	フロセミド注射液	20	mg																																	

8

CBDCA + S-1 (5/80) (TS-1)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
3	大塚生食注	250	mL	点滴		10:30	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC																										
	※TS-1内服 80mg/㎡ d1-d14																												

≪CbP≫ Tri-weekly CBDCA + PTX (6/200)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	デキサート注射液	20	mg																										
	ファモチジン注射用	20	mg																										
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
4	テルモ生食	500	mL	点滴	前投薬内服あり	11:00	3	時間	○																				
	パクリタキセル注	200	mg/㎡																										
5	大塚生食注	250	mL	点滴		14:00	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC																										

CBDCA + アブラキサン (6/100)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○							○						
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
3	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分								○							○						
	デキサート注射液	4	mg																										
4	大塚生食注	（投与量に応じて）		点滴		10:30	30	分	○							○							○						
	アブラキサン点滴静注用	100	mg/㎡																										
5	大塚生食注	250	mL	点滴		11:00	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC																										

CDGP + DOC (100/60)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																											
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																											
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																																	
	デキサート注射液	8	mg																																	
3	大塚糖液 5%	250	mL	点滴		10:30	1	時間	○																											
	ドセタキセル点滴静注用	60	mg/㎡																																	
4	テルモ生食	500	mL	点滴		11:30	2	時間	○																											
	アクプラ静注用	100	mg/㎡																																	
5	テルモ生食 500mL	500	mL	点滴		13:30	2	時間	○																											

DOC (60)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	デキサート注射液	4	mg																										
3	大塚糖液 5%	250	mL	点滴		10:30	1	時間	○																				
	ドセタキセル点滴静注用	60	mg/㎡																										

13

GEM (1000)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○							○													
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○							○													
	デキサート注射液	4	mg																																	
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30	分	○							○							○													
	ゲムシタビン点滴静注用	1000	mg/㎡																																	

14

VNR (25)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○													
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○													
	デキサート注射液	4	mg																										
3	大塚生食注	50	mL	点滴		10:30	5	分	○							○													
	ロゼウス静注液	25	mg/㎡																										
4	ソルデム3A	200	mL	点滴		10:35	20	分	○							○													

15

Tri-weekly CBDCA + PTX + BV (6/200/15)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1.5	時間	○																				
	アバスチン点滴静注用	15	mg/kg																										
3	大塚生食注	100	mL	点滴		11:30	30	分	○																				
	デキサート注射液	20	mg																										
	ファモチジン注射用 20mg「サワイ」	20	mg																										
4	大塚生食注	100	mL	点滴		12:00	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
5	テルモ生食	500	mL	点滴	前投薬内服あり	12:30	3	時間	○																				
	パクリタキセル注	200	mg/㎡																										
6	大塚生食注	250	mL	点滴		15:30	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC																										

BV maintenance (15)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1.5	時間	○																				
	アバスチン点滴静注用	15	mg/kg																										

BV + タルセバ (15/150) (タルセバ)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1.5	時間	○																				
	アバスチン点滴静注用	15	mg/kg																										
	※タルセバ内服 150mg 連日																												

サイラムザ + DOC (10/60)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	デキサート注射液）	4	mg																										
	ネオレスタール注射液	10	mg																										
3	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:30	1	時間	○																				
	サイラムザ点滴静注	10	mg/kg																										
4	大塚生食注	100	mL	点滴		11:30	1	時間	○																				
5	大塚糖液 5%	250	mL	点滴		12:30	1	時間	○																				
	ドセタキセル点滴静注用	60	mg/㎡																										

サイラムザ + タルセバ（10/150）（タルセバ）

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○													
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○													
	ネオレスタール注射液10mg	10	mg																			
3	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:30	1	時間	○													
	サイラムザ点滴静注	10	mg/kg																			
4	大塚生食注	50	mL	点滴		11:30	15	分	○													
	※タルセバ内服 150mg 連日																					

オプジーボ（240）

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14
1	大塚生食注	250	mL	点滴（任意速度）		10:00			○													
2	大塚生食注	50	mL	点滴		10:00	30	分	○													
	オプジーボ点滴静注	240	mg																			

キイトルーダ（200）

※キイトルーダを1回400mg、6週間ごとに投与するレジメンもあります。

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	大塚生食注	250	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	キイトルーダ点滴静注	200	mg																										

22

テセントリク（1200）

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	大塚生食注	250	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1	時間	○																				
	テセントリク点滴静注	1200	mg																										

イミフィンジ（10）

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14
1	大塚生食注	250	mL	点滴（任意速度）		10:00			○													
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	1	時間	○													
	イミフィンジ点滴静注	10	mg/kg																			

オプジーボ + ヤーボイ (360/1)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28	d29	d30	d31	d32	d33	d34	d35	d36	d37	d38	d39	d40	d41	d42
1	大塚生食注	250	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																					○																						
2	大塚生食注	20	mL	点滴		10:00	30	分	○																					○																						
	オプジーボ点滴静注	360	mg																																																			
3	大塚生食注	50	mL	点滴		10:30	30	分	○																					○																						
4	大塚生食注	20	mL	点滴		11:00	30	分	○																																													
	ヤーボイ点滴静注液	1	mg/kg																																																			
5	大塚生食注	50	mL	点滴		11:30	30	分	○																																													

CDDP + PEM + オプジーボ + ヤーボイ (75/500/360/1)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28	d29	d30	d31	d32	d33	d34	d35	d36	d37	d38	d39	d40	d41	d42
1	テルモ生食	1000	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																					○																						
2	大塚生食注	20	mL	点滴		10:00	30	分	○																					○																						
	オプジーボ点滴静注	360	mg																																																		
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30	分	○																																												
4	大塚生食注	20	mL	点滴		11:00	30	分	○																																												
	ヤーボイ点滴静注液	1	mg/kg																																																		
5	テルモ生食	500	mL	点滴		11:30	1	時間	○																					○																						
6	大塚生食注	100	mL	点滴		12:30	30	分	○																					○																						
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																																																		
	デキサート注射液	12	mg																																																		
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																																																		
7	大塚生食注	100	mL	点滴		13:00	10	分	○																					○																						
	アリムタ注射用	500	mg/㎡																																																		
	※葉酸、ビタミンB12併用																																																				
8	ソルデム3A	200	mL	点滴		13:10	30	分	○																					○																						
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL	8	mL																																																		
9	テルモ生食	300	mL	点滴		13:40	1.5	時間	○																					○																						
	シスプラチン点滴静注	75	mg/㎡																																																		
10	テルモ生食	500	mL	点滴		15:10	1.5	時間	○																					○																						
	フロセミド注射液	20	mg																																																		

CBDCA + PEM + オプジーボ + ヤーボイ (6/500/360/1)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28	d29	d30	d31	d32	d33	d34	d35	d36	d37	d38	d39	d40	d41	d42
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																					○																					
2	大塚生食注	20	mL	点滴		10:00	30	分	○																					○																					
	オプジーボ点滴静注	360	mg																																																	
3	大塚生食注	50	mL	点滴		10:30	30	分	○																																											
4	大塚生食注	20	mL	点滴		11:00	30	分	○																																											
	ヤーボイ点滴静注液	1	mg/kg																																																	
5	大塚生食注	50	mL	点滴		11:30	30	分	○																					○																					
6	大塚生食注	100	mL	点滴		12:00	30	分	○																					○																					
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																																																	
	デキサート注射液	8	mg																																																	
7	大塚生食注	100	mL	点滴		12:30	10	分	○																					○																					
	アリムタ注射用	500	mg/㎡																																																	
	※葉酸、ビタミンB12併用																																																			
8	ソルデム3A	200	mL	点滴		12:40	30	分	○																					○																					
9	大塚生食注	250	mL	点滴		13:10	1	時間	○																					○																					
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC																																																	

Tri-weekly CBDCA + PTX + オプジーボ + ヤーボイ (6/200/360/1)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28	d29	d30	d31	d32	d33	d34	d35	d36	d37	d38	d39	d40	d41	d42
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																					○																						
2	大塚生食注	20	mL	点滴		10:00	30	分	○																					○																						
	オプジーボ点滴静注	360	mg																																																		
3	大塚生食注	50	mL	点滴		10:30	30	分	○																																												
4	大塚生食注	20	mL	点滴		11:00	30	分	○																																												
	ヤーボイ点滴静注液	1	mg/kg																																																		
5	大塚生食注	50	mL	点滴		11:30	30	分	○																					○																						
6	大塚生食注	100	mL	点滴		12:00	30	分	○																					○																						
	デキサート注射液	20	mg																																																		
	ファモチジン注射用	20	mg																																																		
7	大塚生食注	100	mL	点滴		12:30	30	分	○																					○																						
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																																																		
8	テルモ生食	500	mL	点滴	前投薬内服あり	13:00	3	時間	○																					○																						
	パクリタキセル注	200	mg/㎡																																																		
9	大塚生食注	250	mL	点滴		16:00	1	時間	○																					○																						
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC																																																		

CDDP + PEM + キイトルーダ (75/500/200)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	1000	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	キイトルーダ点滴静注	200	mg																										
3	テルモ生食	500	mL	点滴		10:30	1.5	時間	○																				
4	大塚生食注	100	mL	点滴		12:00	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	12	mg																										
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																										
5	大塚生食注	100	mL	点滴		12:30	10	分	○																				
	アリムタ注射用	500	mg/㎡																										
	※葉酸、ビタミンB12併用																												
6	ソルデム3A	200	mL	点滴		12:40	30	分	○																				
	硫酸Ｍｇ補正液1mEq/mL 20mL	8	mL																										
7	テルモ生食	300	mL	点滴		13:10	1.5	時間	○																				
	シスプラチン点滴静注	75	mg/㎡																										
8	テルモ生食	500	mL	点滴		14:40	1.5	時間	○																				
	フロセミド注射液	20	mg																										

29

CBDCA + PEM + キイトルーダ (5/500/200)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	キイトルーダ点滴静注	200	mg																										
3	大塚生食注	50	mL	点滴		10:30	5	分	○																				
4	大塚生食注	100	mL	点滴		10:35	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
5	大塚生食注	100	mL	点滴		11:05	10	分	○																				
	アリムタ注射用	500	mg/㎡																										
	※葉酸、ビタミンB12併用																												
6	ソルデム3A	200	mL	点滴		11:15	30	分	○																				
7	大塚生食注	250	mL	点滴		11:45	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC																										

PEM + キイトルーダ（500/200）（維持療法）

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	キイトルーダ点滴静注	200	mg																										
3	大塚生食注	50	mL	点滴		10:30	5	分	○																				
4	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ	100	mL	点滴		10:35	30	分	○																				
	デキサート注射液	8	mg																										
5	大塚生食注	100	mL	点滴		11:05	10	分	○																				
	アリムタ注射用	500	mg/㎡																										
	※葉酸、ビタミンB12併用																												

CBDCA + アブラキサン + キイトルーダ (6/100/200)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○							○						
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	キイトルーダ点滴静注	200	mg																										
3	大塚生食注	50	mL	点滴		10:30	5	分	○																				
4	大塚生食注	100	mL	点滴		10:35	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
5	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:35	30	分								○							○						
	デキサート注射液	4	mg																										
6	大塚生食注	（投与量に応じて）		点滴		11:05	30	分	○							○							○						
	アブラキサン点滴静注用	100	mg/㎡																										
7	大塚生食注	250	mL	点滴		11:35	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC																										

Tri-weekly CBDCA + PTX + BV + テセントリク (6/175/15/1200)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1	時間	○																				
	テセントリク点滴静注	1200	mg																										
3	大塚生食注	50	mL	点滴		11:00	5	分	○																				
4	大塚生食注	100	mL	点滴	点滴時間短縮可	11:05	1.5	時間	○																				
	アバスチン点滴静注用	15	mg/kg																										
5	大塚生食注	100	mL	点滴		12:35	30	分	○																				
	デキサート注射液	20	mg																										
	ファモチジン注射用	20	mg																										
6	大塚生食注	100	mL	点滴		13:05	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
7	テルモ生食	500	mL	点滴		13:35	3	時間	○																				
	パクリタキセル注	175	mg/㎡																										
8	大塚生食注	250	mL	点滴		16:35	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC																										

BV + テセントリク (15/1200) (維持療法)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1	時間	○																				
	テセントリク点滴静注	1200	mg																										
3	大塚生食注	50	mL	点滴		11:00	5	分	○																				
4	大塚生食注	100	mL	点滴	点滴時間短縮可	11:05	1.5	時間	○																				
	アバスチン点滴静注用	15	mg/kg																										

34

CBDCA + PEM + テセントリク (6/500/1200)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1	時間	○																				
	テセントリク点滴静注	1200	mg																										
3	大塚生食注	50	mL	点滴		11:00	5	分	○																				
4	大塚生食注	100	mL	点滴		11:05	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
5	大塚生食注	100	mL	点滴		11:35	10	分	○																				
	アリムタ注射用	500	mg/㎡																										
	※葉酸、ビタミンB12併用																												
6	ソルデム3A	200	mL	点滴		11:45	30	分	○																				
7	大塚生食注	250	mL	点滴		12:15	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC																										

PEM + テセントリク (500/1200)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1	時間	○																				
	テセントリク点滴静注	1200	mg																										
3	大塚生食注	50	mL	点滴		11:00	5	分	○																				
4	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ	100	mL	点滴		11:05	30	分	○																				
	デキサート注射液	8	mg																										
5	大塚生食注	100	mL	点滴		11:35	10	分	○																				
	アリムタ注射用	500	mg/㎡																										
	※葉酸、ビタミンB12併用																												

CBDCA + アブラキサン + テセントリク (6/100/1200)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○							○						
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1	時間	○																				
	テセントリク点滴静注	1200	mg																										
3	大塚生食注	50	mL	点滴		11:00	5	分	○																				
4	大塚生食注	100	mL	点滴		11:05	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
5	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ	100	mL	点滴		11:05	30	分								○							○						
	デキサート注射液	4	mg																										
6	大塚生食注	（投与量に応じて）		点滴		11:35	30	分	○							○							○						
	アブラキサン点滴静注用	100	mg/㎡																										
7	大塚生食注	250	mL	点滴		12:05	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC																										

≪IP≫ CDDP + CPT-11 (60/60)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28
1	ソルデム3A または テルモ生食	1000	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																											
2	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00										○							○													
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																											
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																																	
	デキサート注射液	12	mg																																	
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																																	
4	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分								○							○													
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																																	
	デキサート注射液	8	mg																																	
5	テルモ生食	500	mL	点滴		10:30	1.5	時間	○							○							○													
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	60	mg/㎡																																	
6	テルモ生食	500	mL	点滴		12:00	1.5	時間	○																											
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL	8	mL																																	
7	テルモ生食	300	mL	点滴		13:30	1.5	時間	○																											
	シスプラチン注	60	mg/㎡																																	
8	テルモ生食	500	mL	点滴		15:00	1.5	時間	○																											
	フロセミド注射液	20	mg																																	

≪ICb≫ CBDCA + CPT-11 (5/50)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○													
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○													
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
3	テルモ生食	500	mL	点滴		10:30	1.5	時間	○							○													
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	50	mg/㎡																										
4	大塚生食注	250	mL	点滴		12:00	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC																										

≪PE≫ CDDP + VP-16 (80/100)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	1000	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00				○	○																		
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	12	mg																										
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																										
4	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分		○	○																		
	デキサート注射液	2	mg																										
5	テルモ糖液 5%	500	mL	点滴		10:30	2	時間	○	○	○																		
	ラステット注	100	mg/㎡																										
6	テルモ生食	500	mL	点滴		12:30	1.5	時間	○																				
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL	8	mL																										
7	テルモ生食	300	mL	点滴		14:00	1.5	時間	○																				
	シスプラチン注	80	mg/㎡																										
8	テルモ生食	500	mL	点滴		15:30	1.5	時間	○																				
	フロセミド注射液	20	mg																										

≪CbE≫ CBDCA + VP-16 (5/100)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○	○	○																		
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分		○	○																		
	デキサート注射液	4	mg																										
4	テルモ糖液 5%	500	mL	点滴		10:30	2	時間	○	○	○																		
	ラステット注	100	mg/㎡																										
5	大塚生食注	250	mL	点滴		12:30	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC																										

AMR (45) (div)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○	○	○																		
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分		○	○																		
	デキサート注射液	8	mg																										
4	大塚生食注	50	mL	点滴		10:30	5	分	○	○	○																		
	カルセド注射用	45	mg/㎡																										

ハイカムチン（1）

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○	○	○	○	○																
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○	○	○	○	○																
	ハイカムチン注射用	1.0	mg/㎡																										

Weekly PTX (80) (6投2休)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28	d29	d30	d31	d32	d33	d34	d35	d36	d37	d38	d39	d40	d41	d42	d43	d44	d45	d46	d47	d48	d49	d50	d51	d52	d53	d54	d55	d56
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○							○							○							○							○							○																							
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○							○							○							○							○							○																							
	デキサート注射液	8	mg																																																																
	ファモチジン注射用	20	mg																																																																
3	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ	100	mL	点滴		10:30	30	分	○							○							○							○							○							○																							
4	大塚糖液 5%	250	mL	点滴	前投薬内服あり	11:00	1	時間	○							○							○							○							○							○																							
	パクリタキセル注	80	mg/㎡																																																																

CBDCA + VP-16 + テセントリク (5/100/1200)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○	○	○																		
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1	時間	○																				
	テセントリク点滴静注	1200	mg																										
3	大塚生食注	50	mL	点滴		11:00	5	分	○																				
4	大塚生食注	100	mL	点滴		11:05	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
5	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分		○	○																		
	デキサート注射液	4	mg																										
6	テルモ糖液 5%	500	mL	点滴		11:35	2	時間	○	○	○																		
	ラステット注	100	mg/㎡																										
7	大塚生食注	250	mL	点滴		13:35	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC																										

テセントリク（1200）（維持療法）

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	250	mL	点滴	点滴時間短縮可	10:00	1	時間	○																				
	テセントリク点滴静注	1200	mg																										

CDDP + VP-16 + イミフィンジ (80/100/1500)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	ソルデム3A または テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		11:00				○	○																		
3	大塚生食注	250	mL	点滴		10:00	1	時間	○																				
	イミフィンジ点滴静注	1500	mg																										
	※体重30kg以下の場合は20mg/kg																												
4	大塚生食注	50	mL	点滴		11:00	5	分	○																				
5	大塚生食注	100	mL	点滴		11:05	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	12	mg																										
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																										
6	大塚生食注	100	mL	点滴		11:00	30	分		○	○																		
	デキサート注射液	4	mg																										
7	テルモ糖注 5%	500	mL	点滴		11:35	1.5	時間	○	○	○																		
	ラステット注	100	mg/㎡																										
8	大塚生食注	250	mL	点滴		13:05	1	時間	○																				
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL	8	mL																										
9	テルモ生食	300	mL	点滴		14:05	1.5	時間	○																				
	シスプラチン点滴静注	80	mg/㎡																										
10	テルモ生食	500	mL	点滴		15:35	1.5	時間	○																				
	フロセミド注射液	20	mg																										

CBDCA + VP-16 + イミフィンジ (5/100/1500)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○	○	○																		
2	大塚生食注	250	mL	点滴		10:00	1	時間	○																				
	イミフィンジ点滴静注	1500	mg																										
	※体重30kg以下の場合は20mg/kg																												
3	大塚生食注	50	mL	点滴		11:00	5	分	○																				
4	大塚生食注	100	mL	点滴		11:05	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
5	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分		○	○																		
	デキサート注射液	4	mg																										
6	テルモ糖注 5%	500	mL	点滴		11:35	1.5	時間	○	○	○																		
	ラステット注	100	mg/㎡																										
7	大塚生食注	250	mL	点滴		13:05	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC																										

イミフィンジ（1500）

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																											
2	大塚生食注	250	mL	点滴		10:00	1	時間	○																											
	イミフィンジ点滴静注	1500	mg																																	
	※体重30kg以下の場合は20mg/kg																																			

CDDP + PEM (75/500)（胸膜中皮腫）

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	1000	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	テルモ生食	500	mL	点滴		10:00	1.5	時間	○																				
3	大塚生食注	100	mL	点滴		11:30	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	12	mg																										
	プロイメンド点滴静注用	150	mg																										
4	大塚生食注	100	mL	点滴		12:00	10	分	○																				
	アリムタ注射用	500	mg/㎡																										
	※葉酸、ビタミンB12併用																												
5	ソルデム3A	200	mL	点滴		12:10	30	分	○																				
	硫酸Ｍｇ補正液1mEq/mL 20mL	8	mL																										
6	テルモ生食	300	mL	点滴		12:40	1.5	時間	○																				
	シスプラチン点滴静注	75	mg/㎡																										
7	テルモ生食	500	mL	点滴		14:10	1.5	時間	○																				
	フロセミド注射液	20	mg																										

CBDCA + PEM (5/500)（胸膜中皮腫）

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																				
2	大塚生食注	100	mL	点滴		10:00	30	分	○																				
	アロキシ静注0.75mg 5mL	5	mL																										
	デキサート注射液	8	mg																										
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	10	分	○																				
	アリムタ注射用	500	mg/㎡																										
	※葉酸、ビタミンB12併用																												
4	ソルデム3A	200	mL	点滴		10:40	30	分	○																				
5	大塚生食注	250	mL	点滴		11:10	1	時間	○																				
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC																										

オプジーボ（240）（胸膜中皮腫）

※オプジーボを1回480mg、4週間ごとに投与するレジメンもあります。

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14
1	大塚生食注	250	mL	点滴（任意速度）		10:00			○													
2	大塚生食注	50	mL	点滴		10:00	30	分	○													
	オプジーボ点滴静注240mg	240	mg																			

オプジーボ + ヤーボイ (360/1) (胸膜中皮腫)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻（目安）	点滴時間		d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21	d22	d23	d24	d25	d26	d27	d28	d29	d30	d31	d32	d33	d34	d35	d36	d37	d38	d39	d40	d41	d42
1	大塚生食注	250	mL	点滴（任意速度）		10:00			○																					○																					
2	大塚生食注	20	mL	点滴		10:00	30	分	○																					○																					
	オプジーボ点滴静注 240mg 24mL	360	mg																																																	
3	大塚生食注	50	mL	点滴		10:30	30	分	○																					○																					
4	大塚生食注	20	mL	点滴		11:00	30	分	○																																												
	ヤーボイ点滴静注液	1	mg/kg																																																		
5	大塚生食注	50	mL	点滴		11:30	30	分	○																																												