

No.	対象	レジメン名	1サイクル (日)
1	乳がん	«AC» ADM + CPA (60/600)	21
2	乳がん	Weekly PTX (80) (連投用)	7
3	乳がん	Weekly ハーセプチン + PTX (4→2/80) (連投用)	7
4	乳がん	Tri-weekly ハーセプチン (8→6)	21
5	乳がん	パージェタ + ハーセプチン + PTX (420/6/80)	21
6	乳がん	パージェタ + ハーセプチン (420/6)	21
7	乳がん	カドサイラ (3.6)	21
8	乳がん	Weekly PTX + BV (90/10)	28
9	乳がん	ハラヴェン (1.4)	21
10	乳がん	アブラキサン + テセントリク (100/840)	28

No.1

## «AC» ADM + CPA (60/600)

順序	治療内容	投与時間	1コース (21日間)	
			1日目	.....
1	ソルデム 3 A または生理食塩液	無色 輸液	任意速度	● .....
2	生理食塩液 プロイメント 150mg	無色 吐き気止め	約30分 10:00～10:30	● .....
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 12mg	無色 吐き気止め	約30分 10:30～11:00	● .....
4	生理食塩液 アドリアシン 60mg/m <sup>2</sup>	赤色 化学療法薬	約5分 11:00～11:05	● .....
5	生理食塩液 エンドキサン 600mg/m <sup>2</sup>	無色 化学療法薬	約30分 11:05～11:35	● .....

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.2

## Weekly PTX (80) (連投用)

順序	治療内容	投与時間	1コース (7日間)	
			1日目	...
1	ソルデム 3 A または生理食塩液	無色 輸液	任意速度	● ...
2	生理食塩液 デキサート 8mg ファモチジン 20mg	無色 アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00～10:30	● ...
3	グラニセトロン 3mg	無色 吐き気止め	約30分 10:30～11:00	● ...
4	5%糖液 パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup>	無色 化学療法薬	約1時間 11:00～12:00	● ...

※パクリタキセルのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

1週間ごとに治療を繰り返します。

No.3

## Weekly ハーセプチン + PTX (4→2/80) (連投用)

順序	治療内容	投与時間	1コース (7日間)	
			1日目	...
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	...
2	生理食塩液 ハーセプチン 初回4mg/kg、以降2mg/kg  化学療法薬	約1.5時間 10:00～11:30	●	...
3	生理食塩液 デキサート 8mg ファモチジン 20mg  アレルギー予防 吐き気止め	約30分 11:30～12:00	●	...
4	グラニセトロン 3mg  吐き気止め	約30分 12:00～12:30	●	...
5	生理食塩液 パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup>  化学療法薬	約1時間 12:30～13:30	●	...

※パクリタキセルのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

\*投与時間は10時に開始した場合を示しています。

1週間ごとに治療を繰り返します。

No.4

## Tri-weekly ハーセプチン (8→6)

順序	治療内容	投与時間	1コース (21日間)	
			1日目	・・・・・
1	ソルデム 3 A または生理食塩液	無色 輸液	任意速度	● ・・・・・
2	生理食塩液 ハーセプチン 初回8mg/kg、以降6mg/kg	無色 化学療法薬	約1.5時間 10:00～11:30	● ・・・・・

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.5

## パージェタ + ハーセプチン + PTX (420/6/80)

順序	治療内容	投与時間	1コース (21日間)						
			1日目	...	8日目	...	15日目	...	...
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	...	●	...	●	...	...
2	生理食塩液 デキサート 8mg ファモチジン 20mg 	アレルギー予防 吐き気止め 約30分 10:00～10:30		●	...	●	...	●	...
3	グラニセトロン 3mg 	吐き気止め 約30分 10:30～11:00		●	...	●	...	●	...
4	5%糖液 パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup> 	化学療法薬 約1時間 11:00～12:00		●	...	●	...	●	...
5	生理食塩液 パージェタ 初回840mg、以降420mg 	化学療法薬 約1時間 12:00～13:00		●	.....				
6	生理食塩液 	輸液 (省略可) 約1時間 13:00～14:00		●	.....				
7	生理食塩液 ハーセプチン 初回8mg/kg、以降6mg/kg 	化学療法薬 約1.5時間 14:00～15:30		●	.....				


※パクリタキセルのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.6

## パージェタ + ハーセプチン (420/6)

順序	治療内容	投与時間	1コース (21日間)	
			1日目	・・・・
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	・・・・
2	生理食塩液 パージェタ 初回840mg、以降420mg  化学療法薬	約1時間 10:00～11:00	●	・・・・
3	生理食塩液  輸液 (省略可)	約1時間 11:00～12:00	●	・・・・
4	生理食塩液 ハーセプチン 初回8mg/kg、以降6mg/kg  化学療法薬	約1.5時間 12:00～13:00	●	・・・・

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.7

## カドサイラ (3.6)

順序	治療内容	投与時間	1コース (21日間)	
			1日目	・・・・・
1	ソルデム 3 A または生理食塩液	無色 輸液	任意速度	● ・・・・・
2	グラニセトロン 3mg デキサート 4mg	無色 吐き気止め	約30分 10:00～10:30	● ・・・・・
3	生理食塩液 カドサイラ 3.6mg/kg	無色 化学療法薬	約1.5時間 10:30～12:00	● ・・・・・

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.8

## Weekly PTX + BV (90/10)

順序	治療内容	投与時間	1コース (28日間)					
			1日目	...	8日目	...	15日目	.....
1	ソルデム 3 A または生理食塩液	無色 輸液	任意速度	●	...	●	...	● .....
2	生理食塩液 デキサート 8mg ファモチジン 20mg	無色 アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00～10:30	●	...	●	...	● .....
3	グラニセトロン 3mg	無色 吐き気止め	約30分 10:30～11:00	●	...	●	...	● .....
4	5%糖液 パクリタキセル 90mg/m <sup>2</sup>	無色 化学療法薬	約1時間 11:00～12:00	●	...	●	...	● .....
5	生理食塩液 アバスチン 10mg/kg	無色 化学療法薬	約1.5時間 12:00～13:30	●	.....		●	.....

※パクリタキセルのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

\*投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。

No.9

## ハラヴェン (1.4)

順序	治療内容	投与時間	1コース (21日間)			
			1日目	...	8日目	.....
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	...	●	.....
2	グラニセトロン 3mg  吐き気止め	約30分 10:00～10:30	●	...	●	.....
3	生理食塩液 ハラヴェン 1.4mg/m <sup>2</sup>  化学療法薬	約5分 10:30～10:35	●	...	●	.....

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.10

## アブラキサン + テセントリク (100/840)

順序	治療内容	投与時間	1コース (28日間)					
			1日目	...	8日目	...	15日目	...
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	...	●	...	●	...
2	生理食塩液 テセントリク 840mg  化学療法薬	約1時間 10:00～11:00	●	...	...	...	●	...
3	生理食塩液  輸液	約5分 11:00～11:05	●	...	...	...	●	...
4	グラニセトロン 3mg デキサート 4mg  吐き気止め	約30分 11:05～11:35	●	...	●	...	●	...
5	生理食塩液 アブラキサン 100mg/m <sup>2</sup>  化学療法薬	約30分 11:35～12:05	●	...	●	...	●	...

\* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。