

No.	対象	レジメン名	1サイクル (日)
1	食道がん	S1 + CDDP (2hr) (80/70) (TS-1) (食道がん)	28
2	食道がん	Weekly PTX (100) (6投1休)	49
3	胃がん	S1 + CDDP (80/60) (TS-1)	35
4	胃がん	CDDP + ハーセプチン (ゼロータ) (80/8→6)	21
5	胃がん・大腸がん	XELOX (130/2000) (ゼロータ)	21
6	胃がん	S1 + DOC (80/40) (TS-1)	21
7	胃がん	サイラムザ + PTX (8/80)	28
8	胃がん	CPT-11 (150)	14
9	胃がん	オブジーボ (240)	14
10	大腸がん	mFOLFOX6 (インフューザー)	14
11	大腸がん	FOLFIRI (インフューザー)	14
12	大腸がん	mFOLFOX6 (インフューザー) + BV (5)	14
13	大腸がん	FOLFIRI (インフューザー) + BV (5)	14
14	大腸がん	XELOX (130/2000) (ゼロータ) + BV (7.5)	21
15	大腸がん	mFOLFOX6 (インフューザー) + Cet (400→250)	14
16	大腸がん	FOLFIRI (インフューザー) + Cet (400→250)	14
17	大腸がん	bw mFOLFOX6 (インフューザー) + Cet (500)	14
18	大腸がん	bw FOLFIRI (インフューザー) + Cet (500)	14
19	大腸がん	mFOLFOX6 (インフューザー) + Pan (6)	14
20	大腸がん	FOLFIRI (インフューザー) + Pan (6)	14
21	大腸がん	FOLFIRI (インフューザー) + サイラムザ (8)	14
22	大腸がん	FOLFIRI (インフューザー) + ザルトラップ (4)	14
23	大腸がん	mFOLFOXIRI (インフューザー) + BV (5)	14

No.1

S1 + CDDP (2hr) (80/70) (TS-1) (食道がん)

				1コース (28日間)			
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	
内服	ティーエスワン 80mg/m ²  化学療法薬	内服	 1日目～14日目に内服				
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  無色 輸液	任意速度	・・・		●	・・・	
2	生理食塩液 プロイメンド 150mg  無色 吐き気止め	約30分 10:00～10:30	・・・		●	・・・	
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 12mg  無色 吐き気止め	約30分 10:30～11:00	・・・		●	・・・	
4	生理食塩液 硫酸マグネシウム 8mEq  無色 輸液 腎障害予防	約1.5時間 11:00～12:30	・・・		●	・・・	
5	生理食塩液 シスプラチン 70mg/m ²  無色 化学療法薬	約2時間 12:30～14:30	・・・		●	・・・	
6	生理食塩液 フロセミド 20mg  無色 輸液 利尿薬	約2.5時間 14:30～17:00	・・・		●	・・・	

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。

No.2

Weekly PTX (100) (6投1休)

1コース (49日間)

順序	治療内容	投与時間	1コース (49日間)													
			1日目	...	8日目	...	15日目	...	22日目	...	29日目	...	36日目	...		
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	...	●	...	●	...	●	...	●	...	●	...	●
2	生理食塩液 デキサート 8mg ファモチジン 20mg  アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	...	●	...	●	...	●	...	●	...	●	...	●
3	グラニセトロン 3mg  吐き気止め	約30分 10:30~11:00	●	...	●	...	●	...	●	...	●	...	●	...	●
4	5%糖液 パクリタキセル 100mg/m ²  化学療法薬	約1時間 11:00~12:00	●	...	●	...	●	...	●	...	●	...	●	...	●

※パクリタキセルのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

7週間ごとに治療を繰り返します。

No.3

S1 + CDDP (80/60) (TS-1)


				1コース (35日間)			
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	
内服	ティーエスワン 80mg/m ²  化学療法薬	内服	 1日目～21日目に内服				
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  無色 輸液	任意速度	・・・		●	・・・	
2	生理食塩液 プロイメンド 150mg  無色 吐き気止め	約30分 10:00～10:30	・・・		●	・・・	
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 12mg  無色 吐き気止め	約30分 10:30～11:00	・・・		●	・・・	
4	生理食塩液 硫酸マグネシウム 8mEq  無色 輸液 腎障害予防	約1.5時間 11:00～12:30	・・・		●	・・・	
5	生理食塩液 シスプラチン 60mg/m ²  無色 化学療法薬	約2時間 12:30～14:30	・・・		●	・・・	
6	生理食塩液 フロセミド 20mg  無色 輸液 利尿薬	約2.5時間 14:30～17:00	・・・		●	・・・	

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

5週間ごとに治療を繰り返します。

No.4

CDDP + ハーセプチン (ゼローダ) (80/8→6)

				1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目	
内服	ゼローダ 2000mg/m ²  化学療法薬	内服		1日目～14日目に内服	
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度	●	
2	生理食塩液 ハーセプチン  化学療法薬 初回8mg/kg、以降6mg/kg	約1.5時間 10:00～11:30	●	
3	生理食塩液 プロイメンド 150mg  吐き気止め	約30分 11:30～12:00	●	
4	生理食塩液 アロキシ 0.75mg  吐き気止め デキサート 12mg	約30分 12:00～12:30	●	
5	生理食塩液 硫酸マグネシウム 8mEq  輸液 腎障害予防	約1.5時間 12:30～14:00	●	
6	生理食塩液 シスプラチン 80mg/m ²  化学療法薬	約2時間 14:00～16:00	●	
7	生理食塩液 フロセミド 20mg  輸液 利尿薬	約1.5時間 16:00～17:30	●	

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.5

XELOX (130/2000) (ゼローダ)

					1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目		
内服	ゼローダ 2000mg/m ²  化学療法薬	内服	 1日目～14日目に内服		
1	生理食塩液  無色 輸液	任意速度	●		
2	生理食塩液 アロキシシ 0.75mg デキサート 8mg  無色 吐き気止め	約30分 10:00～10:30	●		
3	5%糖液 エルプラット 130mg/m ²  無色 化学療法薬	約2時間 10:30～12:30	●		

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.6

S1 + DOC (80/40) (TS-1)

				1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目	
内服	ティーエスワン 80mg/m ²  化学療法薬	内服		
1	ソルデム 3 A または生理食塩液  輸液	任意速度		
2	グラニセトロン 3mg デキサート 4mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30		
3	5%糖液 ドセタキセル 40mg/m ²  化学療法薬	約1時間 10:30~11:30		

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.7

サイラムザ + PTX (8/80)

			1コース (28日間)					
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	・・・	●	・・・	●	・・・
2	生理食塩液 デキサート 8mg ファモチジン 20mg  アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	・・・	●	・・・	●	・・・
3	生理食塩液 サイラムザ 8mg/kg  化学療法薬	約1時間 10:30~11:30	●	・・・			●	・・・
4	生理食塩液  輸液	約30分 11:30~12:00	●	・・・			●	・・・
5	グラニセトロン 3mg  吐き気止め	約30分 12:00~12:30	●	・・・	●	・・・	●	・・・
6	生理食塩液 パクリタキセル 80mg/m ²  化学療法薬	約1時間 12:30~13:30	●	・・・	●	・・・	●	・・・

※パクリタキセルのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

*投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。

No.8

CPT-11 (150)



			1コース (14日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目	
1	ソルデム 3 A または生理食塩液 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;">  無色 </div> 輸液	任意速度	●	
2	生理食塩液 アロキシシ 0.75mg デキサート 8mg <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;">  無色 </div> 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●	
3	生理食塩液 イリノテカン 150mg/m ² <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;">  無色 </div> 化学療法薬	約1.5時間 10:30~12:00	●	

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.9

オプジーボ (240)






			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 オプジーボ 240mg  化学療法薬	約30分 10:00~10:30	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.10

mFOLFOX6 (インフューザー)







			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg 	約30分 10:00~10:30	●
3	5%糖液 レボホリナート 200mg/m ² 	約2時間 10:30~12:30	●
4	5%糖液 エルプラット 85mg/m ² 	約2時間 10:30~12:30	●
5	生理食塩液 5-FU 400mg/m ² 	約5分 12:30~12:35	●
6	生理食塩液 5-FU 2400mg/m ² 	約46時間 12:30~翌々日10:30	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.11

FOLFIRI (インフューザー)

			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●
3	5%糖液 レボホリナート 200mg/m ²  化学療法薬	約2時間 10:30~12:30	●
4	5%糖液 イリノテカン 150mg/m ²  化学療法薬	約1.5時間 10:30~12:00	●
5	生理食塩液 5-FU 400mg/m ²  化学療法薬	約5分 12:30~12:35	●
6	生理食塩液 5-FU 2400mg/m ²  化学療法薬	約46時間 12:30~翌々日10:30	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.12

mFOLFOX6 (インフューザー) + BV (5)








			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 アバスタチン 5mg/kg 	約1.5時間 10:00~11:30	●
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg 	約30分 11:30~12:00	●
4	5%糖液 レボホリナート 200mg/m ² 	約2時間 12:00~14:00	●
5	5%糖液 エルプラット 85mg/m ² 	約2時間 12:00~14:00	●
6	生理食塩液 5-FU 400mg/m ² 	約5分 14:00~14:05	●
7	生理食塩液 5-FU 2400mg/m ² 	約46時間 14:05~翌々日12:05	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.13

FOLFIRI (インフューザー) + BV (5)

			1コース (14日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目	
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	
2	生理食塩液 アバスチン 5mg/kg  化学療法薬	約1.5時間 10:00~11:30	●	
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 11:30~12:00	●	
4	5%糖液 レボホリナート 200mg/m ²  化学療法薬	約2時間 12:00~14:00	●	
5	5%糖液 イリノテカン 150mg/m ²  化学療法薬	約1.5時間 12:00~13:30	●	
6	生理食塩液 5-FU 400mg/m ²  化学療法薬	約5分 14:00~14:05	●	
7	生理食塩液 5-FU 2400mg/m ²  化学療法薬	約46時間 14:05~翌々日12:05	●	

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.14

XELOX (130/2000) (ゼローダ) + BV (7.5)

				1コース (21日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目	
内服	ゼローダ 2000mg/m ²  化学療法薬	内服		1日目~14日目に内服	
1	生理食塩液  無色 輸液	任意速度		
2	生理食塩液 アバスチン 7.5mg/kg  無色 化学療法薬	約1.5時間 10:00~11:30		
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  無色 吐き気止め	約30分 11:30~12:00		
4	5%糖液 エルプラット 130mg/m ²  無色 化学療法薬	約2時間 12:00~14:00		

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

No.15

mFOLFOX6 (インフューザー) + Cet (400→250)




順序	治療内容	投与時間	1コース (14日間)			
			1日目	・・・	8日目	・・・
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	・・・	●	・・・
2	生理食塩液 デキサート 8mg ネオレスタール 10mg  アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00～10:30	●	・・・	●	・・・
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg  吐き気止め	約30分 10:30～11:00	●	・・・		
4	生理食塩液  輸液	約30分 10:30～11:00	・・・		●	・・・
5	生理食塩液 アービタックス 初回400mg/m ² 、以降250mg/m ²  化学療法薬	約2時間 11:00～13:00	●	・・・	●	・・・
6	生理食塩液  輸液	約1時間 13:00～14:00	●	・・・	●	・・・
7	5%糖液 レボホリナート 200mg/m ²  化学療法薬	約2時間 14:00～16:00	●	・・・		
8	5%糖液 エルプラット 85mg/m ²  化学療法薬	約2時間 14:00～16:00	●	・・・		
9	生理食塩液 5-FU 400mg/m ²  化学療法薬	約5分 16:00～16:05	●	・・・		
10	生理食塩液 5-FU 2400mg/m ²  化学療法薬	約46時間 16:05～翌々日14:05	●	・・・		

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.16

FOLFIRI (インフューザー) + Cet (400→250)








順序	治療内容	投与時間	1コース (14日間)			
			1日目	・・・	8日目	・・・
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●	・・・	●	・・・
2	生理食塩液 デキサート 8mg ネオレスタール 10mg  アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00～10:30	●	・・・	●	・・・
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg  吐き気止め	約30分 10:30～11:00	●	・・・		
4	生理食塩液  輸液	約30分 10:30～11:00	・・・		●	・・・
5	生理食塩液 アービタックス 初回400mg/m ² 、以降250mg/m ²  化学療法薬	約2時間 11:00～13:00	●	・・・	●	・・・
6	生理食塩液  輸液	約1時間 13:00～14:00	●	・・・	●	・・・
7	5%糖液 レボホリナート 200mg/m ²  化学療法薬	約2時間 14:00～16:00	●	・・・		
8	5%糖液 イリノテカン 150mg/m ²  化学療法薬	約1.5時間 14:00～15:30	●	・・・		
9	生理食塩液 5-FU 400mg/m ²  化学療法薬	約5分 16:00～16:05	●	・・・		
10	生理食塩液 5-FU 2400mg/m ²  化学療法薬	約46時間 16:05～翌々日14:05	●	・・・		

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.17

bw mFOLFOX6 (インフューザー) + Cet (500)

			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 デキサート 8mg ネオレスタール 10mg  アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg  吐き気止め	約30分 10:30~11:00	●
4	生理食塩液 アービタックス 500mg/m ²  化学療法薬	約2時間 11:00~13:00	●
5	生理食塩液  輸液	約1時間 13:00~14:00	●
6	5%糖液 レボホリナート 200mg/m ²  化学療法薬	約2時間 14:00~16:00	●
7	5%糖液 エルプラット 85mg/m ²  化学療法薬	約2時間 14:00~16:00	●
8	生理食塩液 5-FU 400mg/m ²  化学療法薬	約5分 16:00~16:05	●
9	生理食塩液 5-FU 2400mg/m ²  化学療法薬	約46時間 16:05~翌々日14:05	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.18

bw FOLFIRI (インフューザー) + Cet (500)

			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 デキサート 8mg ネオレスタール 10mg  アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg  吐き気止め	約30分 10:30~11:00	●
4	生理食塩液 アービタックス 500mg/m ²  化学療法薬	約2時間 11:00~13:00	●
5	生理食塩液  輸液	約1時間 13:00~14:00	●
6	5%糖液 レボホリナート 200mg/m ²  化学療法薬	約2時間 14:00~16:00	●
7	5%糖液 イリノテカン 150mg/m ²  化学療法薬	約1.5時間 14:00~15:30	●
8	生理食塩液 5-FU 400mg/m ²  化学療法薬	約5分 16:00~16:05	●
9	生理食塩液  化学療法薬	約46時間 16:05~翌々日14:05	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.19

mFOLFOX6 (インフューザー) + Pan (6)

			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 アロキシシ 0.75mg デキササート 8mg 	約30分 10:00~10:30	●
3	生理食塩液 ベクティビックス 6mg/kg 	約1時間 10:30~11:30	●
4	生理食塩液 	約1時間 11:30~12:30	●
5	5%糖液 レボホリナート 200mg/m ² 	約2時間 12:30~14:30	●
6	5%糖液 エルプラット 85mg/m ² 	約2時間 12:30~14:30	●
7	生理食塩液 5-FU 400mg/m ² 	約5分 14:30~14:35	●
8	生理食塩液 5-FU 2400mg/m ² 	約46時間 14:35~翌々日12:35	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.20

FOLFIRI (インフューザー) + Pan (6)

1コース (14日間)					
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●
3	生理食塩液 ベクティビックス 6mg/kg  化学療法薬	約1時間 10:30~11:30	●
4	生理食塩液  輸液	約1時間 11:30~12:30	●
5	5%糖液 レボホリナート 200mg/m ²  化学療法薬	約2時間 12:30~14:30	●
6	5%糖液 イリノテカン 150mg/m ²  化学療法薬	約1.5時間 12:30~14:00	●
7	生理食塩液 5-FU 400mg/m ²  化学療法薬	約5分 14:30~14:35	●
8	生理食塩液 5-FU 2400mg/m ²  化学療法薬	約46時間 14:35~翌々日12:35	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.21

FOLFIRI (インフューザー) + サイラムザ (8)

			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg ネオレスタール 10mg  アレルギー予防 吐き気止め	約30分 10:00~10:30	●
3	生理食塩液 サイラムザ 8mg/kg  化学療法薬	約1時間 10:30~11:30	●
4	生理食塩液  輸液	約1時間 11:30~12:30	●
5	5%糖液 レボホリナート 200mg/m ²  化学療法薬	約2時間 12:30~14:30	●
6	5%糖液 イリノテカン 150mg/m ²  化学療法薬	約1.5時間 12:30~14:00	●
7	生理食塩液 5-FU 400mg/m ²  化学療法薬	約5分 14:30~14:35	●
8	生理食塩液 5-FU 2400mg/m ²  化学療法薬	約46時間 14:35~翌々日12:35	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.22

FOLFIRI (インフューザー) + ザルトラップ (4)

			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 アロキシシ 0.75mg デキサート 8mg 	約30分 10:00~10:30	●
3	生理食塩液 ザルトラップ 4mg/kg 	約1時間 10:30~11:30	●
4	5%糖液 レボホリナート 200mg/m ² 	約2時間 11:30~13:30	●
5	5%糖液 イリノテカン 150mg/m ² 	約1.5時間 11:30~13:00	●
6	生理食塩液 5-FU 400mg/m ² 	約5分 13:30~13:35	●
7	生理食塩液 5-FU 2400mg/m ² 	約46時間 13:35~翌々日11:35	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

No.23

mFOLFOXIRI (インフューザー) + BV (5)

			1コース (14日間)	
順序	治療内容	投与時間	1日目
1	生理食塩液  輸液	任意速度	●
2	生理食塩液 アバチン 5mg/kg  化学療法薬	約1.5時間 10:00~11:30	●
3	生理食塩液 アロキシ 0.75mg デキサート 8mg  吐き気止め	約30分 11:30~12:00	●
4	5%糖液 イリノテカン 150mg/m ²  化学療法薬	約1時間 12:00~13:00	●
5	5%糖液 エルプラット 85mg/m ²  化学療法薬	約2時間 13:00~15:00	●
6	5%糖液 レボホリナート 200mg/m ²  化学療法薬	約2時間 13:00~15:00	●
7	生理食塩液 5-FU 2400mg/m ²  化学療法薬	約46時間 15:00~翌々日13:00	●

* 投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。