

No.	主な使用がん種	プロトコル名
1	リンパ腫	R-CHOP (ブレドニン) [1DAY] (375/750/50/1.4/100)
2	リンパ腫	R-CVP (ブレドニン) [1DAY] (375/750/1.4/40)
3	リンパ腫	R-THP-COP (ブレドニン) [1DAY] (375/30/500/1/30)
4	リンパ腫	R-Bend [1DAY] (375/90)
5	リンパ腫	【DLBCL】R-Bend [1DAY] (375/120)
6	リンパ腫	≪GCD-R≫ GEM + CBDCA + Dex + RIT (1000/5/40/375)
7	リンパ腫	≪GDP-R≫ GEM + Dex + CDDP + RIT (1000/40/75/375)
8	リンパ腫	≪GDP≫ GEM + Dex + CDDP (1000/40/75)
9	リンパ腫	RIT (375)
10	リンパ腫	RIT (375) (maintenance)
11	リンパ腫	G-CHOP (ブレドニン) [1DAY] (1000/750/50/1.4/100)
12	リンパ腫	G-CVP (ブレドニン) [1DAY] (1000/750/1.4/100)
13	リンパ腫	G-Bend [1DAY] (1000/90)
14	リンパ腫	G (1000) (維持療法)
15	リンパ腫	pola-R-Bend (1.8/375/90)
16	リンパ腫	オブジーボ (240)
17	リンパ腫	ポテリジオ (1)
18	リンパ腫	R2 (375/20)
19	リンパ腫	ABVD (25/10/6/375)
20	リンパ腫	アドセトリス-AVD (1.2/25/6/375)
21	リンパ腫	アドセトリス-CHP (1.8/750/50/100)
22	骨髄腫	(皮下) ≪VMP≫ ベルケイド + L-PAM + PSL (1.3/9/60) (アルケラン・ブレドニン)
23	骨髄腫	≪KRd≫ カイプロリス + レブラミド + Dex (20→27/25/40) (レブラミド)
24	骨髄腫	≪Kd≫ (週2回投与) カイプロリス + Dex (20→56/20)
25	骨髄腫	≪Kd≫ (週1回投与) カイプロリス + Dex (20→70/40)
26	骨髄腫	【ダラキューロ】≪DLd≫ Dara + Len + Dex (1800/25/40) (レブラミド・レナデックス)
27	骨髄腫	【ダラキューロ】≪DBd≫ Dara + ベルケイド + Dex (1800/1.3/80) (レナデックス)
28	骨髄腫	【ダラキューロ】≪DVMP≫ Dara + ベルケイド + アルケラン + PSL (1800/1.3/9/60) (アルケラン・PSL)
29	骨髄腫	【ダラキューロ】≪DKd≫ Dara + CFZ + Dex (1800/20→56/40)
30	骨髄腫	≪ELd≫ エムブリシテ + レブラミド + Dex (10/25/28) (レブラミド)
31	骨髄腫	≪EPd≫ エムブリシテ + ポマリスト + Dex (10/4/28) (ポマリスト)
32	骨髄腫	≪IPd≫ サークリサ + ポマリスト + Dex (10/4/40) (ポマリスト・レナデックス)
33	白血病・骨髄異形成症候群	(皮下) ピダーザ (75)
34	白血病	(皮下) ピダーザ + ベネクレクタ (75/400)

※RとCHOPを別日に投与するレジメンもあります。

[illegible]

※RとCVPを別日に投与するレジメンもあります。

[illegible]

※RとTHP-COPを別日に投与するレジメンもあります。

[illegible]

R-Bend [1DAY] (375/90)

※Rをd1、Bendをd2-3に投与するレジメンもあります。

[illegible]

【DLBCL】 R-Bend [1DAY] (375/120)

※Rをd1、Bendをd2-3に投与するレジメンもあります。

[illegible]

«GCD-R» GEM + CBDCA + Dex + RIT (1000/5/40/375)

[illegible]

«GDP-R» GEM + Dex + CDDP + RIT (1000/40/75/375)

[illegible]

«GDP» GEM + Dex + CDDP (1000/40/75)

[illegible]

[illegible]

RIT (375) (maintenance)

[illegible]

G-CHOP（プレドニン） [1DAY] (1000/750/50/1.4/100)

[illegible]

G-CVP (プレドニン) [1DAY] (1000/750/1.4/100)

[illegible]

G-Bend [1DAY] (1000/90)

[illegible]

pol a-R-Bend (1.8/375/90)

[illegible]

G (1000) (維持療法)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

R2 (375/20)

[illegible]

ABVD (25/10/6/375)

[illegible]

アドセトリス-AVD (1.2/25/6/375)

[illegible]

アドセトリス-CHP (1.8/750/50/100)

[illegible]

(皮下) ≪VMP≫ ベルケイド + L-PAM + PSL (1.3/9/60) (アルケラン・プレドニン)

[illegible]

《KRd》 カイプロリス + レブラミド + Dex (20→27/25/40) (レブラミド)

[illegible]

《Kd》（週2回投与）カイプロリス + Dex（20→56/20）

[illegible]

《Kd》 (週1回投与) カイプロリス + Dex (20→70/40)

[illegible]

【ダラキューロ】《DLd》 Dara + Len + Dex (1800/25/40) (レブラミド・レナデックス)

※ダラキューロの代わりにダラザレックス点滴静注を用いるレジメンもあります。

[illegible]

【ダラキューロ】 ≪DBd≫ Dara + ベルケイド + Dex (1800/1.3/80) (レナデッキス)

※ダラキューロの代わりにダラザレックス点滴静注を用いるレジメンもあります。

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻 (目安)	点滴時間	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ダラキューロ配合皮下注	1800	mg	皮下注射	前投薬内服あり	10:00		○							○							○						
	※4コース目以降はd1のみ (9コース目以降はインターバル28日間)																											
2	大塚生食注	(投与量に応じて)		皮下注射		10:10		○			○				○			○										
	ベルケイド注射用	1.3	mg/m ²																									
	※9コース目以降なし																											
	※レナデックス内服 20mg d1 2 4 5 8 9 11 12 15 (9コース目以降はd1のみ)																											

【ダラキューロ】 ≪DVMP≫ Dara + ベルケイド + アルケラン + PSL (1800/1.3/9/60) (アルケラン・PSL)

※ダラキューロの代わりにダラザレックス点滴静注を用いるレジメンもあります。

[illegible]

【ダラキューロ】 ≪DKd≫ Dara + CFZ + Dex (1800/20→56/40)

※ダラキューロの代わりにダラザレックス点滴静注を用いるレジメンもあります。

[illegible]

《ELd》 エムプリシティ + レブラミド + Dex (10/25/28) (レブラミド)

[illegible]

《EPd》 エムプリシティ + ポマリスト + Dex (10/4/28) (ポマリスト)

[illegible]

《IPd》 サークリサ + ポマリスト + Dex (10/4/40) (ポマリスト・レナデックス)

[illegible]

(皮下) ビダーザ (75)

※ビダーザを点滴静注するレジメンもあります。

[illegible]

(皮下) ビダーザ + ベネクレクタ (75/400)

※ビダーザを点滴静注するレジメンもあります。

[illegible]