

No.	主な使用がん種	プロトコル名
1	リンパ腫	R-CHOP (ブレドニン) [1DAY] (375/750/50/1.4/100)
2	リンパ腫	R-CVP (ブレドニン) [1DAY] (375/750/1.4/40)
3	リンパ腫	R-THP-COP (ブレドニン) [1DAY] (375/30/500/1/30)
4	リンパ腫	R-Bend [1DAY] (375/90)
5	リンパ腫	【DLBCL】R-Bend [1DAY] (375/120)
6	リンパ腫	≪GCD-R≫ GEM + CBDCA + Dex + RIT (1000/5/40/375)
7	リンパ腫	≪GDP-R≫ GEM + Dex + CDDP + RIT (1000/40/75/375)
8	リンパ腫	≪GDP≫ GEM + Dex + CDDP (1000/40/75)
9	リンパ腫	RIT (375)
10	リンパ腫	RIT (375) (maintenance)
11	リンパ腫	G-CHOP (ブレドニン) [1DAY] (1000/750/50/1.4/100)
12	リンパ腫	G-CVP (ブレドニン) [1DAY] (1000/750/1.4/100)
13	リンパ腫	G-Bend [1DAY] (1000/90)
14	リンパ腫	G (1000) (維持療法)
15	リンパ腫	pola-R-Bend (1.8/375/90)
16	リンパ腫	オブジーボ (240)
17	リンパ腫	ボテリジオ (1)
18	リンパ腫	R2 (375/20)
19	リンパ腫	ABVD (25/10/6/375)
20	リンパ腫	アドセトリス-AVD (1.2/25/6/375)
21	リンパ腫	アドセトリス-CHP (1.8/750/50/100)
22	リンパ腫	エブキンリ (0.16→0.8→48) (1コース目)
23	リンパ腫	エブキンリ (48) (2-3コース目)
24	リンパ腫	エブキンリ (48) (4-9コース目)
25	リンパ腫	エブキンリ (48) (10コース目以降)
26	リンパ腫	キイトルーダ (200)
27	リンパ腫	エルレフィオ (3-24週目)
28	骨髄腫	(皮下) ≪VMP≫ ボルテゾミブ + L-PAM + PSL (1.3/9/60) (アルケラン・ブレドニン)
29	骨髄腫	≪KRd≫ カイプロリス + レブラミド + Dex (20→27/25/40) (レブラミド)
30	骨髄腫	≪Kd≫ (週2回投与) カイプロリス + Dex (20→56/20)
31	骨髄腫	≪Kd≫ (週1回投与) カイプロリス + Dex (20→70/40)
32	骨髄腫	【ダラキューロ】≪DLd≫ Dara + Len + Dex (1800/25/40) (レブラミド・レナデックス)
33	骨髄腫	【ダラキューロ】≪DBd≫ Dara + ボルテゾミブ + Dex (1800/1.3/80) (レナデックス)
34	骨髄腫	【ダラキューロ】≪DVMP≫ Dara + ボルテゾミブ + アルケラン + PSL (1800/1.3/9/60) (アルケラン・PSL)
35	骨髄腫	【ダラキューロ】≪DKd≫ Dara + CFZ + Dex (1800/20→56/40)
36	骨髄腫	≪ELd≫ エムブリシテ + レブラミド + Dex (10/25/28) (レブラミド)
37	骨髄腫	≪EPd≫ エムブリシテ + ポマリスト + Dex (10/4/28) (ポマリスト)
38	骨髄腫	≪IPd≫ サークリサ + ポマリスト + Dex (10/4/40) (ポマリスト・レナデックス)
39	白血病・骨髄異形成症候群	(皮下) アザシチジン (75)
40	白血病	(皮下) ピダーザ + ベネクレクスタ (75/400)

※RとCHOPを別日に投与するレジメンもあります。

[illegible]

※RとCVPを別日に投与するレジメンもあります。

[illegible]

※RとTHP-COPを別日に投与するレジメンもあります。

[illegible]

R-Bend [1DAY] (375/90)

※Rをd1、Bendをd2-3に投与するレジメンもあります。

[illegible]

【DLBCL】 R-Bend [1DAY] (375/120)

※Rをd1、Bendをd2-3に投与するレジメンもあります。

[illegible]

«GCD-R» GEM + CBDCA + Dex + RIT (1000/5/40/375)

[illegible]

«GDP-R» GEM + Dex + CDDP + RIT (1000/40/75/375)

[illegible]

«GDP» GEM + Dex + CDDP (1000/40/75)

[illegible]

[illegible]

RIT (375) (maintenance)

[illegible]

G-CHOP（プレドニン）[1DAY]（1000/750/50/1.4/100）

[illegible]

G-CVP (プレドニン) [1DAY] (1000/750/1.4/100)

[illegible]

G-Bend [1DAY] (1000/90)

[illegible]

pol a-R-Bend (1.8/375/90)

[illegible]

G (1000) (維持療法)

[illegible]

[illegible]

ポテリジォ (1)

Rp	薬品名	投与量	単位	手技	コメント	開始時刻 （目安）	点滴時間	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
1	テルモ生食	500	mL	点滴（任意速度）		10:00		○						
2	大塚生食注 ソル・コーテフ注射用	100 100	mL mg	点滴		10:00	30分	○						
3	大塚生食注	100	mL	点滴		10:30	30分	○						
4	大塚生食注 ポテリジオ点滴静注	250 1	mL mg/kg	点滴	前投薬内服あり	11:00	2時間	○						

R2 (375/20)

[illegible]

ABVD (25/10/6/375)

[illegible]

アドセトリス-AVD (1.2/25/6/375)

[illegible]

アドセトリス-CHP (1.8/750/50/100)

[illegible]

(皮下) ≪VMP≫ ボルテゾミブ + L-PAM + PSL (1.3/9/60) (アルケラン・プレドニン)

[illegible]

《KRd》 カイプロリス + レブラミド + Dex (20→27/25/40) (レブラミド)

[illegible]

《Kd》 (週2回投与) カイプロリス + Dex (20→56/20)

[illegible]

《Kd》 (週1回投与) カイプロリス + Dex (20→70/40)

[illegible]

【ダラキューロ】《DLd》 Dara + Len + Dex (1800/25/40) (レブラミド・レナデックス)

※ダラキューロの代わりにダラザレックス点滴静注を用いるレジメンもあります。

[illegible]

【ダラキューロ】 ≪DBd≫ Dara + ポルテゾミブ + Dex (1800/1.3/80) (レナデックス)

※ダラキューロの代わりにダラザレックス点滴静注を用いるレジメンもあります。

[illegible]

【ダラキューロ】 ≪DVMP≫ Dara + ボルテゾミブ + アルケラン + PSL (1800/1.3/9/60) (アルケラン・PSL)

※ダラキューロの代わりにダラザレックス点滴静注を用いるレジメンもあります。

[illegible]

【ダラキューロ】 ≪DKd≫ Dara + CFZ + Dex (1800/20→56/40)

※ダラキューロの代わりにダラザレックス点滴静注を用いるレジメンもあります。

[illegible]

《ELd》 エムプリシティ + レブラミド + Dex (10/25/28) (レブラミド)

[illegible]

《EPd》 エムプリシティ + ポマリスト + Dex (10/4/28) (ポマリスト)

[illegible]

《IPd》 サークリサ + ポマリスト + Dex (10/4/40) (ポマリスト・レナデックス)

[illegible]

[v4]★(皮下)アザシチジン (75)

[illegible]

[v3]★(皮下)アザシチジン+ベネクレクタ (75/400)

[illegible]

エプキンリ (0.16→0.8→48) (1コ-8目)

[illegible]

エプキンリ (48) (2-3コ入目)

[illegible]

エプキンリ (48) (4-9コース目)

[illegible]

エプキンリ (48) (10コース目以降)

[illegible]

キイトルーダ (200)

※6週ごとのレジメンもあります。

[illegible]

エルレフィオ (3-24週目)

[illegible]

エルレフィオ（25週目以降）

[illegible]