

| No. | 主な使用がん種      | プロトコル名                                                                 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | リンパ腫         | R-CHOP (ブレドニン) [1DAY] (375/750/50/1.4/100)                             |
| 2   | リンパ腫         | R-CVP (ブレドニン) [1DAY] (375/750/1.4/40)                                  |
| 3   | リンパ腫         | R-THP-COP (ブレドニン) [1DAY] (375/30/500/1/30)                             |
| 4   | リンパ腫         | R-Bend [1DAY] (375/90)                                                 |
| 5   | リンパ腫         | 【DLBCL】R-Bend [1DAY] (375/120)                                         |
| 6   | リンパ腫         | ≪GCD-R≫ GEM + CBDCA + Dex + RIT (1000/5/40/375)                        |
| 7   | リンパ腫         | ≪GDP-R≫ GEM + Dex + CDDP + RIT (1000/40/75/375)                        |
| 8   | リンパ腫         | ≪GDP≫ GEM + Dex + CDDP (1000/40/75)                                    |
| 9   | リンパ腫         | RIT (375)                                                              |
| 10  | リンパ腫         | RIT (375) (maintenance)                                                |
| 11  | リンパ腫         | G-CHOP (ブレドニン) [1DAY] (1000/750/50/1.4/100)                            |
| 12  | リンパ腫         | G-CVP (ブレドニン) [1DAY] (1000/750/1.4/100)                                |
| 13  | リンパ腫         | G-Bend [1DAY] (1000/90)                                                |
| 14  | リンパ腫         | G (1000) (維持療法)                                                        |
| 15  | リンパ腫         | pola-R-Bend (1.8/375/90)                                               |
| 16  | リンパ腫         | オブジーボ (240)                                                            |
| 17  | リンパ腫         | ボテリジオ (1)                                                              |
| 18  | リンパ腫         | R2 (375/20)                                                            |
| 19  | リンパ腫         | ABVD (25/10/6/375)                                                     |
| 20  | リンパ腫         | アドセトリス-AVD (1.2/25/6/375)                                              |
| 21  | リンパ腫         | アドセトリス-CHP (1.8/750/50/100)                                            |
| 22  | リンパ腫         | エブキンリ (0.16→0.8→48) (1コース目)                                            |
| 23  | リンパ腫         | エブキンリ (48) (2-3コース目)                                                   |
| 24  | リンパ腫         | エブキンリ (48) (4-9コース目)                                                   |
| 25  | リンパ腫         | エブキンリ (48) (10コース目以降)                                                  |
| 26  | リンパ腫         | キイトルーダ (200)                                                           |
| 27  | リンパ腫         | エルレフィオ (3-24週目)                                                        |
| 28  | リンパ腫         | ルンスミオ (60) (2コース目)                                                     |
| 29  | リンパ腫         | ★ルンスミオ (30) (3コース目以降)                                                  |
| 30  | 骨髄腫          | (皮下) ≪VMP≫ ボルテゾミブ + L-PAM + PSL (1.3/9/60) (アルケラン・ブレドニン)               |
| 31  | 骨髄腫          | ≪KRd≫ カイプロリス + レブラミド + Dex (20→27/25/40) (レブラミド)                       |
| 32  | 骨髄腫          | ≪Kd≫ (週2回投与) カイプロリス + Dex (20→56/20)                                   |
| 33  | 骨髄腫          | ≪Kd≫ (週1回投与) カイプロリス + Dex (20→70/40)                                   |
| 34  | 骨髄腫          | 【ダラキューロ】≪DLd≫ Dara + Len + Dex (1800/25/40) (レブラミド・レナデックス)             |
| 35  | 骨髄腫          | 【ダラキューロ】≪DBd≫ Dara + ボルテゾミブ + Dex (1800/1.3/80) (レナデックス)               |
| 36  | 骨髄腫          | 【ダラキューロ】≪DVMP≫ Dara + ボルテゾミブ + アルケラン + PSL (1800/1.3/9/60) (アルケラン・PSL) |
| 37  | 骨髄腫          | 【ダラキューロ】≪DKd≫ Dara + CFZ + Dex (1800/20→56/40)                         |
| 38  | 骨髄腫          | ≪ELd≫ エムブリシティ + レブラミド + Dex (10/25/28) (レブラミド)                         |
| 39  | 骨髄腫          | ≪EPd≫ エムブリシティ + ボマリスト + Dex (10/4/28) (ボマリスト)                          |
| 40  | 骨髄腫          | ≪IPd≫ サークリサ + ボマリスト + Dex (10/4/40) (ボマリスト・レナデックス)                     |
| 41  | 骨髄腫          | テクベイリ (1.5) (2コース目以降)                                                  |
| 42  | 白血病          | (皮下) ビダーザ + ベネクレクタ (75/400)                                            |
| 43  | 白血病・骨髄異形成症候群 | (皮下) アザシチジン (75)                                                       |

※RとCHOPを別日に投与するレジメンもあります。

[illegible]

## R-CVP (プレドニン) [1DAY] (375/750/1.4/40)

※RとCVPを別日に投与するレジメンもあります。

[illegible]

※RとTHP-COPを別日に投与するレジメンもあります。

[illegible]

## R-Bend [1DAY] (375/90)

※Rをd1、Bendをd2-3に投与するレジメンもあります。

[illegible]

**【DLBCL】 R-Bend [1DAY] (375/120)**

※Rをd1、Bendをd2-3に投与するレジメンもあります。

[illegible]

«GCD-R» GEM + CBDCA + Dex + RIT (1000/5/40/375)

[illegible]

## «GDP-R» GEM + Dex + CDDP + RIT (1000/40/75/375)

[illegible]

«GDP» GEM + Dex + CDDP (1000/40/75)

[illegible]

[illegible]

## RIT (375) (maintenance)

[illegible]

**G-CHOP（プレドニン） [1DAY] (1000/750/50/1.4/100)**

[illegible]

**G-CVP (プレドニン) [1DAY] (1000/750/1.4/100)**

[illegible]

**G-Bend [1DAY] (1000/90)**

[illegible]

pol a-R-Bend (1.8/375/90)

[illegible]

**G (1000) (維持療法)**

[illegible]

[illegible]

**ポテリジォ (1)**

[illegible]

## R2 (375/20)

[illegible]

**ABVD (25/10/6/375)**

[illegible]

**アドセトリス-AVD (1.2/25/6/375)**

[illegible]

**アドセトリス-CHP (1.8/750/50/100)**

[illegible]

(皮下) ≪VMP≫ ポルテゾミブ + L-PAM + PSL (1.3/9/60) (アルケラン・プレドニン)

[illegible]

《KRd》 カイプロリス + レブラミド + Dex (20→27/25/40) (レブラミド)

[illegible]

《Kd》（週2回投与）カイプロリス + Dex（20→56/20）

[illegible]

《Kd》（週1回投与）カイプロリス + Dex（20→70/40）

[illegible]

## 【ダラキューロ】《DLd》 Dara + Len + Dex (1800/25/40) (レブラミド・レナデックス)

※ダラキューロの代わりにダラザレックス点滴静注を用いるレジメンもあります。

[illegible]

## 【ダラキューロ】 ≪DBd≫ Dara + ボルテゾミブ + Dex (1800/1.3/80) (レナデックス)

※ダラキューロの代わりにダラザレックス点滴静注を用いるレジメンもあります。

| Rp | 薬品名                                                 | 投与量       | 単位                | 手技   | コメント    | 開始時刻<br>(目安) | 点滴時間 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20 | d21 |
|----|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|---------|--------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | ダラキューロ配合皮下注                                         | 1800      | mg                | 皮下注射 | 前投薬内服あり | 10:00        |      | ○  |    |    |    |    |    |    | ○  |    |     |     |     |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     |
|    | ※4コース目以降はd1のみ (9コース目以降はインターバル28日間)                  |           |                   |      |         |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | 大塚生食注                                               | (投与量に応じて) |                   | 皮下注射 |         | 10:10        |      | ○  |    |    | ○  |    |    |    | ○  |    |     | ○   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    | ボルテゾミブ注射用                                           | 1.3       | mg/m <sup>2</sup> |      |         |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    | ※9コース目以降なし                                          |           |                   |      |         |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    | ※レナデックス内服 20mg d1 2 4 5 8 9 11 12 15 (9コース目以降はd1のみ) |           |                   |      |         |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |                                                     |           |                   |      |         |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

【ダラキューロ】 ≪DVMP≫ Dara + ボルテゾミブ + アルケラン + PSL (1800/1.3/9/60) (アルケラン・PSL)

※ダラキューロの代わりにダラザレックス点滴静注を用いるレジメンもあります。

| Rp | 薬品名                                                                                                                                | 投与量       | 単位   | 手技   | コメント    | 開始時刻<br>(目安) | 点滴時間 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20 | d21 | d22 | d23 | d24 | d25 | d26 | d27 | d28 | d29 | d30 | d31 | d32 | d33 | d34 | d35 | d36 | d37 | d38 | d39 | d40 | d41 | d42 |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------|--------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|    | ダラキューロ配合皮下注                                                                                                                        | 1800      | mg   | 皮下注射 | 前投薬内服あり | 10:00        |      | ○  |    |    |    |    |    |    | ○  |    |     |     |     |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|    | ※2-9コース目はd1 22のみ                                                                                                                   |           |      |      |         |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|    | ※10コース目以降はd1のみ（インターバル28日間）                                                                                                         |           |      |      |         |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|    |                                                                                                                                    |           |      |      |         |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
| 2  | 大塚生食注 20mL                                                                                                                         | (投与量に応じて) |      | 皮下注射 |         | 10:10        |      | ○  |    |    | ○  |    |    |    | ○  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ○   |     |     | ○   |     |     |     | ○   |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|    | ホルテゾミブ注射用3mg                                                                                                                       | 1.3       | mg/㎡ |      |         |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|    | ※2-9コース目はd1 8 22 29のみ                                                                                                              |           |      |      |         |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|    | ※10コース目以降なし                                                                                                                        |           |      |      |         |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|    | ※レナデックス内服 20mg d1 8 15 22 29 35 (2-9コース目はd1 22のみ) (10コース目以降はd1のみ)、アルケラン内服 9mg/㎡ d1-4 (10コース目以降なし)、プレドニン内服 60mg/㎡ d2-4 (10コース目以降なし) |           |      |      |         |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |

【ダラキューロ】 ≪DKd≫ Dara + CFZ + Dex (1800/20→56/40)

※ダラキューロの代わりにダラザレックス点滴静注を用いるレジメンもあります。

[illegible]

《ELd》 エムプリシティ + レブラミド + Dex (10/25/28) (レブラミド)

[illegible]

《EPd》 エムプリシティ + ポマリスト + Dex (10/4/28) (ポマリスト)

[illegible]

《IPd》 サークリサ + ポマリスト + Dex (10/4/40) (ポマリスト・レナデックス)

[illegible]

**[v4]★(皮下)アザシチジン (75)**

[illegible]

[v3]★(皮下)アザシチジン+ベネクレクタ (75/400)

[illegible]

エプキンリ (0.16→0.8→48) (1コ-8目)

| Rp | 薬品名                   | 投与量           | 単位   | 手技       | 開始時刻<br>(目安) | 点滴時間 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20 | d21 | d22 | d23 | d24 | d25 | d26 | d27 | d28 |
|----|-----------------------|---------------|------|----------|--------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | 1 テルモ生食 500mL         | 500           | mL   | 点滴（任意速度） | 10:00        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |                       | ソルデム3 A 500mL | 500  |          |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    | 2 エブキンリ皮下注 4mg 0.8mL  | 0.16          | mg   | 皮下注射     | 10:00        |      | ○  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |                       | 大塚生食注 20mL    | 0.97 |          |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    | 3 エブキンリ皮下注 4mg 0.8mL  | 0.8           | mg   | 皮下注射     | 10:00        |      |    |    |    |    |    |    |    | ○  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |                       | 大塚生食注 20mL    | 0.84 |          |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | mL  |
|    | 4 エブキンリ皮下注 48mg 0.8mL | 48            | mg   | 皮下注射     | 10:00        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     | ○   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |                       |               |      |          |              |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**エプキンリ (48) (2-3コー入目)**

[illegible]

**エプキンリ (48) (4-9コース目)**

[illegible]

**エプキンリ (48) (10コース目以降)**

[illegible]

**キイトルーダ (200)**

※6週ごとのレジメンもあります。

[illegible]

エルレフィオ（3-24週目）

[illegible]

エルレフィオ（25週目以降）

[illegible]

[v2]★ルンスミオ(60)(2コース目)

[illegible]

**[v2]★ルンスミオ(30)(3コース目以降)**

[illegible]

[illegible]