

気管支喘息 西濃地域連携クリニカルパス

かかりつけ医

患者氏名： 様

大垣市民病院 患者 ID:

かかりつけ医 患者 ID:

大垣市民病院 主治医名：

かかりつけ医：

病院・医院クリニック

先生

施設	市民病院から紹介	かかりつけ医	市民病院(検査・診察)	かかりつけ医	市民病院(検査)	市民病院 (結果説明)
経過	平成 年 月 日	紹介から半年後まで	平成 年 月 日	その後の半年間	平成 年 月 日	平成 年 月 日
概要	紹介状を作成	かかりつけ医で喘息の状態を確認しつつ治療を継続	喘息コントロールの状態・呼気 NO 検査、吸入方法を確認し必要に応じて治療内容を検討	かかりつけ医で喘息の状態を確認しつつ治療を継続	胸部 X 線・肺機能検査・呼気 NO 検査などを行います。	検査結果を説明し、検査結果をかかりつけ医に報告します
発作時の対応	喘鳴，呼吸困難などの喘息発作が生じた場合、お渡ししてある喘息カードの記載に従って行動して下さい。（通常メプチンエアーを 2 吸入行い 20 分間様子を見ます。症状が良くならない場合、もう一度メプチンエアーを 2 吸入して 20 分間様子を見ます。）横になって眠れない時，会話が続けられない時は救急外来を受診して下さい。					
検査		かかりつけ医で ・ACT を診療毎に確認し、 喘息カードに挟み込まれたシートへ記入して下さい。	・PEF と ACT 測定 ・呼気 NO 測定 ・半年間の ACT 確認 ・吸入方法再確認 ・治療内容検討	かかりつけ医で ・ACT を診療毎に確認し、 喘息カードに挟み込まれたシートへ記入して下さい。	・PEF と ACT 測定 ・呼気 NO 検査 ・半年間の ACT 確認 ・胸部 X 線検査 ・肺機能検査 などを行います	・検査結果の説明と吸入方法の再確認を行い、かかりつけ医に紹介状で結果報告 ・新たなカードを発行
治療	かかりつけ医受診までの処方	状態に応じて治療をお願いいたします。 バリエーション時にはご紹介下さい。 1) ACT _____ 点未満 2) SABA を 1 日 4 回以上使用 3) コントロール不良 4) PEF が自己ベストの 80% 以下 など	治療内容・吸入方法と病状・経過を再確認し、必要があれば治療内容を変更します	状態に応じて治療をお願いいたします。 バリエーション時にはご紹介下さい。 1) ACT _____ 点未満 2) SABA を 1 日 4 回以上使用 3) コントロール不良 4) PEF が自己ベストの 80% 以下 など	・治療内容・吸入方法と病状・経過などを再確認し、検査結果も参考にして、必要があれば治療内容を変更します ・紹介状を書きますのでかかりつけ医に渡してください	
診察予約	6 ヶ月後の診察予約を入れます	かかりつけ医の指示に従って下さい	6 ヶ月後の検査・診察予約を入れます	かかりつけ医の指示に従って下さい	検査のみで当日診察はありません(診察日と同日になることもあります)	6 ヶ月後の検査・診察予約を入れます

※ 病状に変化が見られた場合、予約外受診はいつでも受け付けます。発作があるのに放置しないようにしてください。

大垣市民病院 呼吸器内科